LL44
L13

3 2044 106 453 723

FL
44
L13



Digitized by Google

~~Melicoq~~ (Lafons de)

Prodrome de la Flore des arrond. d
Laon. Vervins, Rocroy et des env. de M

N° 7

Digitized by Google

Digitized by Google

PRODROME

DE LA FLORE

DES ARRONDISSEMENTS

DE LAON, VERVINS, ROCROY

ET DES ENVIRONS DE NOYON,

PAR

AL. DE LA FONS, B^on^ DE MÉLICOCQ,

Auteur du Calendrier de Flore des environs de Noyon, Membre de plusieurs Sociétés savantes.

J'ai cherché l'auteur de la nature dans ses moindres productions, comme dans celles où il éclate avec le plus de majesté, et partout j'ai entendu cette parole sublime : me voici.

(Bonnet, contemplation de la nature, préface, p. 21).

NOYON.

IMPRIMERIE DE SOULAS-AMOUDRY.

1839.

Digitized by Google

TABLE DES ABRÉVIATIONS.

ÉPOQUES DES FLEURS.

f. *ou* fév. . . . février.	j.^{t} . . . . . juillet.
m.^{s} . . . . . mars.	a.^{t} . . . . . août.
av. . . . . avril.	s. . . . . septembre.
m. . . . . mai.	o. . . . . octobre.
j.^{n} . . . . . juin	n. . . . . novembre.

V. . . . variété.	BG. . . botanicon gallicum.
C. . . . Commun.	L. . . . Linné.
vulg. . vulgairement.	DC. . . Decandolle.

Les autres abréviations sont celles employées dans tous les auteurs.

J'ai séparé par un — les variétés citées à la suite des espèces.

Digitized by Google

INTRODUCTION.

Pendant les longues excursions que j'ai entreprises, au moment où le printemps venait de déployer sa brillante bannière de fleurs, les plantes qui formaient la végétation caractéristique du pays que j'explorais prêtaient à mes recherches un intérêt toujours nouveau. Le contraste frappant que présentent, à cet égard, les environs de Rocroy, comparés à ceux de Laon, est des plus remarquables. Dans le Laonais, en effet, chaque montagne, chaque vallon, offrent à vos regards et des sites nouveaux, et des plantes non encore observées ; auprès de Rocroy, au contraire, sites et végétaux restant les mêmes, l'observateur est tenté d'abandonner des recherches devenues infructueuses.

Cette distribution si diversifiée des végétaux, nous prouve que, de même que les animaux, ils ne sont pas

Digitized by Google

dispersés au hasard sur la surface de notre planète ; mais que la température, la lumière, l'air ou l'atmosphère, l'eau, la nature du sol peuvent seuls expliquer ce phénomène.

Le sol ne peut se considérer que sous deux rapports, comme fournissant des aliments aux végétaux à toutes les époques ou à une seule époque de leur existence, ou bien comme conducteur et conservateur du calorique. Beaucoup de plantes paraissent préférer une nature de terrain à une autre, ou ne peuvent croître que dans celui qui leur est propre : si le climat, la température viennent à changer, elles abandonnent ce terrain, elles en adoptent un second ; bien peu naissent partout indifféremment.

La ressemblance ou la dissemblance des climats doit aussi influer davantage sur les rapports des productions naturelles que la proximité ou l'éloignement des lieux. Pour être convaincu de ce que j'avance il suffit de comparer à la végétation des environs de Rocroy celle du Laonais.

Il est incontestable qu'il existe plusieurs centres de création pour les productions végétales ; que, les plantes des mêmes bassins, quelle que soit l'étendue de ceux-ci, sont plus semblables entre elles que celles des bassins différents, quoique très raprochés ; que les espèces sont réellement aborigènes des lieux où on les trouve, et qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer

Digitized by Google

par la transmigration la présence des espèces communes à des contrées éloignées. *

Remarquons avec quel soin les nombreuses familles des êtres organisés, animaux et plantes, se sont partagé le monde, chacune selon ses corrélations primitives, suivant ses besoins, ses convenances, suivant ses harmonies naturelles avec les lieux. Aucune région de cette terre n'est dépourvue de vie, depuis les profondeurs des mers jusqu'aux hauteurs des cieux, depuis les sables étincelants de la Torride jusqu'aux glaces crépusculaires des pôles. Seulement la vie s'y manifeste à des degrés et sous des modifications divers. Chacune des grandes agrégations vivantes qui en couvrent la surface est généralement confinée à une seule région déterminée et n'en franchit guère les limites ; elles forment là des peuplades stables, filles réelles du sol, dont elles portent l'empreinte, et, pour ainsi dire, le costume, des nations vraies, malgré la diversité des espèces, nations bien autrement permanentes que les nations humaines, car elles ne reconnaissent

* « Aujourd'hui, comme aux jours de Pline et de Columelle, la ja-« cinthe se plaît dans les Gaules, la pervenche en Illyrie, la marguerite « sur les ruines de Numance, et pendant qu'autour d'elles les villes ont « changé de maîtres et de nom, que plusieurs sont rentrées dans le « néant, que les civilisations se sont choquées et brisées, leurs paisibles « générations ont traversé les âges, et se sont succédé l'une à l'autre « jusqu'à nous, fraîches et riantes comme aux jours des batailles. » (Herder, idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, introduction).

Digitized by Google

d'autre empire que celui de la latitude et de la hauteur des lieux, d'autres lois et d'autres révolutions que celles-là même de la planète qui les emporte avec elle dans l'espace.

Ainsi, considérée sous le rapport géognostique, cette uniformité dans la végétation des environs de Rocroy peut facilement être expliquée par l'uniformité de formation (la plus ancienne qui se montre au jour), composée de schistes associés avec des couches de quarzites, de diorites, de psammites, etc., qui constitue tout le terrain occupé par la vaste forêt des Ardennes.

Ce groupe géognostique est partout divisé en deux étages : le plus ancien, où dominent les roches schisteuses ; et le plus nouveau, où ce sont, au contraire, les roches compactes qui ont pris le plus grand développement.

Le sol occupé par cette formation présente une chaîne de montagnes très élevées, terminées ordinairement par des plateaux plus ou moins étendus, qui offrent souvent des flancs très inclinés et même des escarpements assez droits, par exemple le long du cours de la Meuse et de celui de la Semoy.

Les vallées qui sont toutes de fracture, tombent les unes dans les autres sous des angles aigus ; elles sont étroites, à flancs courts souvent fort inclinés. Elles commencent ordinairement par un évasement à pentes douces.

Digitized by Google

Si nous comparons maintenant, sous le même rapport, les environs de Laon à ceux de Rocroy, nous attribuerons encore l'extrême différence de la végétation, non seulement au climat, mais aussi à la composition du sol.

Dans le Laonais, en effet, la formation calcaire * (chaux carbonatée grossière remplacée quelquefois par un banc de sable, remarquable par sa grande épaisseur, puisque souvent il paraît l'emporter, par sa masse, sur celle du calcaire grossier) dominant dans

* On ne saurait nier que les terrains calcaires ont une flore bien différente de celles des autres terrains. Zuccarini et Sieber ont observé ce fait, sur le revers méridional des Alpes ; Wahlenberg a compté dans les Carpathes quarante-trois plantes qui n'appartiennent qu'au sol calcaire ; il a fait les mêmes observations en Suède. La végétation du quartz, du calcaire, de l'argile ne diffère jamais du tout au tout, parceque ces substances ne sont jamais pures, mais toujours mélangées avec d'autres et recouvertes par l'humus qui est partout identique. Il est aussi à remarquer que ces influences ne se font vivement sentir que lorsque la formation occupe une très grande surface.

Il est néanmoins des observations qui viennent infirmer l'exactitude de celles qui précèdent. Wahlenberg avait vu que dans les Carpathes trente-neuf plantes appartenaient exclusivement aux formations calcaires ; de ces trente-neuf plantes il en retrouva vingt-deux sur le granit, en Suisse et en Laponie. Schouw, parcourant la Suisse et les Apennins une carte géologique à la main, n'a point observé de différences suivant les terrains. M. de Candolle a constaté dans ses nombreux voyages agronomiques en France, que les plantes croissaient indifféremment sur tous les terrains ; cependant en Limousin il a été frappé de voir que le châtaignier ne venait que sur les bandes de grès qui traversent cette province, et cette observation a été répétée dans plusieurs localités. (Annales des sciences naturelles, 2e série, t. VIII, p. 87).

Digitized by Google

les contrées montueuses, donne naissance à ces plantes si variées et si nombreuses, tandis qu'auprès de Rocroy la formation schisteuse n'accueille sur ses plateaux élevés et escarpés que quelques bruyères et d'autres plantes plutôt vivaces qu'annuelles.

Si nous quittons actuellement ces montagnes du Laonais, si riches, si pittoresques, une végétation toute différente nous annoncera un sol nouveau. Ce sol qui constitue une grande partie de l'arrondissement de Laon et la presque totalité de celui de Vervins, appartient à la formation crétacée, quelquefois à nu, le plus souvent recouverte d'une couche plus ou moins épaisse de sable ou de terre argileuse.

De profondes vallées (environs de Vervins) bordées d'escarpements rapides, n'étalent plus avec complaisance, comme dans le Laonais, le luxe de leur végétation. Quelques fleurs, ici, là, dispersées, nous rappellent à peine le retour des beaux jours. Ce n'est que dans les vastes forêts de cet arrondissement que la nature s'est plu à déployer toute sa puissance.

Telle se présente partout la formation crétacée : tantôt elle offre à vos regards de hautes collines dont les pentes, se prolongeant en profondes vallées, forment des précipices, des escarpements; tantôt ce sont des pentes douces et cultivées; d'autres fois elle étale à vos regards une vaste plaine stérile et nue, ou fertile et couverte de la plus belle verdure, suivant les

Digitized by Google

quantités respectives d'argile, de silice et de chaux dont le sol est composé.

Je dois faire observer ici que la végétation des tourbières des environs de Rocroy se rapproche déjà de celle des mêmes localités dans les Vosges. On y trouve, en effet, très fréquemment le *viola palustris*, le *juncus squarrosus*, assez souvent le *vaccinium oxycoccos*, qui, tous, à l'exception du *juncus squarrosus*, disparaissent dans les tourbières du Laonais. Le *carum verticillatum* et le *scutellaria minor*, communs auprès de Rocroy, ne croissent plus auprès de Laon, tandis que les *nymphæa*, fréquents dans le Laonais, manquent à Rocroy. Les naturalistes ont cependant remarqué que les terrains tourbeux avaient une végétation toute spéciale et que leur influence était telle que l'on rencontrait les mêmes espèces sur les tourbières des différentes parties de l'Europe; comme si l'influence du sol était prépondérante sur celle du climat lui-même.

Ainsi la végétation prend successivement le caractère de convenance qui se lie le mieux avec l'aspect des localités. Gaie et riante sur les bords des ruisseaux, élégante et gracieuse dans les vallons du Laonais, presque toujours la même sur le sol si souvent accidenté et dans les vastes forêts des environs de Vervins, elle devient toute différente sur les rocs sourcilleux de l'Ardenne et dans ces immenses riezes qui donnent à cette contrée un aspect si triste et si agreste. Ce n'est néanmoins qu'avec un profond sentiment d'admiration

Digitized by Google

que j'ai observé avec quel soin la nature s'est plu à parer et à embellir les plages qu'au premier abord elle semblait avoir traitées avec le moins de bienveillance. Aux anémones, aux alisiers, au chèvrefeuille des bois, au cérisier à grappes, aux géranium, à l'ancolie, aux nombreuses ombellifères enfin qui ornent les bois montueux du Laonais, ont succédé dans l'Ardenne le sureau à grappes, l'airelle myrtille, le muguet verticillé, l'arnique de montagne, la centaurée de montagne, l'alchimille commune, le seneçon sarrasin, les digitales pourpre et à petite fleur, la campanule en tête, etc., qui, apparaissant tour-à-tour sur ce vaste théâtre, ne quitteront la scène qu'au moment où le triste hiver viendra étendre son immense linceul sur la croupe des monts.

Il est difficile de ne pas éprouver un certain sentiment d'intérêt dans la contemplation des mœurs des plantes et de cette multitude de curieux phénomènes dont elles enchantent de toutes parts nos yeux; il est difficile de ne pas les aimer lorsqu'on voit la plupart d'entre elles, semblables en cela aux animaux et à l'homme lui-même, tourner irrésistiblement vers les regards du jour tout ce qu'elles ont de feuillage et de fleurs. C'est un touchant et à la fois un imposant spectacle que de voir ces innombrables familles qui verdoient à la surface du globe, ce monde végétal presque entier s'incliner en silence vers le grand astre, comme des familles humaines, s'émouvoir des approches de son coucher, de son lever, de ses disparitions

Digitized by Google

d'un instant, comme si ces êtres, pourtant si imparfaits, avaient la conscience de tout ce qu'ils lui doivent, comme s'ils sentaient que pour eux aussi la lumière est la source des premiers biens; merveilleuse préordination des choses, admirables sympathies primitives qui réunissent toutes les existences organisées de ce globe sous une même impression d'amour, qui rapprochent de la plus élevée la plus humble, et en assurent la perpétuité dans les embrassements d'une harmonie éternelle.

Puis-je passer ici sous silence la douce mélancolie qui s'emparait de moi, alors que promenant mes regards sur cette végétation si riche, si variée, et écoutant avec un religieux silence cette voix du désert, accent sublime du plaisir, de la crainte et de la douleur, exprimé d'une manière différente par tant d'êtres divers, j'attachais à chaque arbre, à chaque feuille, à chaque plante, un de mes courts moments de félicité! O nature! tandis que bravant impunément la rigueur des frimats, chaque printemps te retrouve parée de ta guirlande de fleurs, la vieillesse et l'expérience se tenant par la main, conduisent l'homme à la mort, et, pour prix de tant d'efforts péniblement prolongés, lui révèlent que la vie entière n'est qu'un long malheur qui le poursuit depuis le berceau jusqu'à la tombe.

Que de lieux aujourd'hui ignorés, nous rappellent les incessantes douleurs de l'humanité! Les trois Barantons prient encore pour leurs maires injustement

Digitized by Google

suppliciés ! Les souterrains de Crécy-sur-Serre murmurent encore les dernières souffrances des serfs que le barbare Thomas de Marle y avait entassés ! Théâtre immuable des révolutions de l'histoire, la nature ramène invariablement ses saisons et ses fleurs, et elle sourit aussi joyeuse sur le tombeau d'une nation que sur celui d'un homme.

Injustice de la nature !
Les arbres dont l'ombrage embellit ces côteaux,
Ne craignent point des ans l'irréparable injure :
Leur vieillesse ne sert qu'à les rendre plus beaux.
Après avoir d'un siècle achevé la mesure,
Ils passent bien avant dans les siècles nouveaux.
Où voit-on quelque homme qui dure
Autant que les sapins, les chênes, les ormeaux.

(*Mad. Deshoulières*).

Digitized by Google

STATISTIQUE-BOTANIQUE

OU

PRODROME DE LA FLORE

DES ARRONDISSEMENTS DE LAON, VERVINS, ROCROY,

ET DES ENVIRONS DE NOYON.

DICOTYLÉDONES.

THALAMIFLORES.

RENONCULACÉES.

Clematis Vitalba, L. (vulg. *herbe aux gueux*). (j.t a.t). Haies.

Thalictrum minus, L. (j.n j.t). Auprès de Nouvion-le-Vineux.

Th. Flavum, L.—V. *B.* T. nigricans, Jacq. (j.n j.t). Fossés, lieux humides, à Chambery, Salmoucy, Liesse, Chivi, Molinchart, les bords de l'Oise. La V. *B* sur les rives de la Meuse, vis-à-vis la roche dite *Dame de Meuse.*

Anemone pulsatilla, L. (vulg. *coquelourde*). av. Fréquente

Digitized by Google

sur les montagnes du Laonais et des environs de Noyon: manque auprès de Vervins et de Rocroy. Je l'ai néanmoins retrouvée, ainsi que le *chlora perfoliata*, entre Moransy et le grand bois de Chaourse; c'est la seule localité des environs de Vervins où j'aie observé ces deux plantes.

Une variété dont la corolle est d'un rose tendre croît auprès de Bussy-lès-Pierrepont.

A. Sylvestris, L. (m. j.ⁿ). Les montagnes, à Mons-en-Laonais, Bourguignon, Bruyère, Parfondru, Fétieux, les bois du Sauvoire, de Salmoucy, de Liesse; les montagnes St Siméon, de Caisne près Noyon.

A. Nemorosa, L. V. *B.* purpurea, J. Bauh. (m.ˢ av.). Haies, prés, bois, C. La variété *B* forêt de Coucy.

A. Ranunculoides, L. (m.ˢ av.). Le bois de Malvaux près Nampcelles (Aisne). J'ai remarqué que cette plante remplaçait dans cette localité l'*anemone nemorosa*, qui y devient très rare.

Hepatica triloba, DC. (vulg. *herbe de la Trinité*). m.ˢ av. Les bois du canton d'Anisy-le-Château.

Adonis æstivalis, L. V. *B.* flava, Vill. BG. (m. j.ⁿ). Les moissons, à Laon, Anteny; la V. *B* à Vigneux.

Myosurus minimus, L. (av. m.). Les moissons, à Laon, Clermont, Vigneux, Rumigny; à Bussy-lès-Pierrepont sur les murs; à Quesmy, Bussy près Noyon.

Ranunculus hederaceus, L. (m. j.ᵗ). Lieux inondés, à Jantes.

R. tripartitus, D C. A Landouzy.

R. aquatilis, L.—V. A. R. hederaceus, Poir. — V. *B.* R. heterophyllus, Hoffm. — V. Y. R. capillaceus, Thuil. — V. D. R. cæspitosus Thuil.—V. *E.* R. fluitans, Lam. Fossés aquatiques. La V. *E* sur la Meuse.

R. lingua, L. (vulg. *grande douve*). j.ⁿ j.ᵗ Presque tous les marais du Laonais; les marais d'Uvé et les étangs de Bailly près Noyon.

R. flammula, L. (vulg. *petite douve*). m. a.ᵗ Marais, fossés.

R. auricomus, L. (av. m.). Lieux ombragés, haies

R. sceleratus, L. (m. j.ⁿ). Marais, fossés.

R. acris, L. (av. j.ⁿ). Prés et montagnes.

R. Repens, L. (vulg. *bassinet, pied-de-poule*). m. a.ᵗ Champs, lieux cultivés.

R. bulbosus, L. (vulg. *rave de St Antoine*). m. j.ⁿ Prés, champs, coteaux.

R. philonotis, DC. V. *B.* R. intermedius, Poir. (m, j.ᵗ). Moissons, près, buissons. J'ai trouvé auprès de Rumigny, une tige aplatie de *ranunculus philonotis*, ornée de deux fleurs soudées par la base de leurs calices, et placées, l'une et l'autre, dans une position verticale.

R. arvensis, L. (m. j.ⁿ). Champs. C.

Ficaria ranunculoides, DC. (vulg. *petite chélidoine*). av. m. Haies et prés humides. C.

Digitized by Google

Caltha palustris, L. (vulg. *souci des marais*). av. m. Prés humides, bords des ruisseaux.

Helleborus viridis, L. (av. m.). Fréquent dans les bois d'Harcigny, de Tenailles, dans les haies, à Vigneux, St Clément, Cuiry; rare dans les bois de Cheret près Laon, dans ceux de Béhéricourt près Noyon.

Helleborus fœtidus, L. (vulg. *pied-de-griffon*). f.r av. Les montagnes de Porquéricourt, de Ville près Noyon; le bois du Val St Pierre. (Il est à remarquer que l'*helleborus fœtidus* est fort rare dans les environs de Vervins, tandis que l'*helleborus viridis* y est très fréquent). Commun auprès de Vireux, Givet, etc., etc.

Nigella arvensis, L. (j.t a.t). Les moissons auprès de Laon, Noyon; à Vigneux.

Aquilegia vulgaris, L. (vulg. *gants de Notre-Dame*). m. j.t V. *B.* flore carneo, (nobis). Commune dans les environs de Laon; les bois montueux à Ville, Grandru, les prés de Carlepont. La variété *B* fort rare près Rocroy. L'espèce se retrouve dans les montagnes entre Chimay et Marienbourg.

Delphinium Ajacis, L. (vulg. *pied d'alouette des jardins*). j.n Subspontanée dans les prés à Presle, dans les moissons à Couvron.

Delphinium consolida, L. (vulg. *pied d'alouette des champs*). V. *B.* flore roseo, (nobis). j.n j.t Moissons; la V. *B* près Chaourse.

Actæa spicata, L. (vulg. *herbe de St Christophe*). m. j.n Les bois montueux, à Commenchon près Chauny; à Fétieux, Parfondru, Laval, Dollignon; dans une rue de Vigneux.

BERBÉRIDÉES.

Berberis vulgaris, L. (vulg. *épine vinette*). m. Les haies, à Veaux-sous-Laon, Blérancourt.

NYMPHÉACÉES.

Nymphæa alba, L. V. *B.* minor, BG. (vulg. *lys des étangs, volet d'eau, herbe aux plateaux*). j.n a.t Les marais du Laonais; jadis dans les étangs de Bailli près Noyon. La V. *B* à Chambery près Laon.

Nuphar lutea, Smith. (vulg. *volet jaune*). j.n a.t. Les étangs et les marais du Laonais où il est moins fréquent que le précédent; les environs de Noyon; à Beaumée, Fligny près Aubenton.

Il est à observer que les *nymphœa* manquent complètement auprès de Rocroy. Le *nuphar lutea* ne se retrouve que sur la Meuse.

Digitized by Google

PAPAVÉRACÉES.

Papaver hybridum, L. Entre Laon et Pierrepont, à Noyon. m. j.ⁿ

P. argemone, L. Les environs de Laon, de Noyon, à Bucilly près Hirson. m. j.ⁿ

P. dubium, L. j.ⁿ Les moissons à Noyon, Vigneux.

P. rhœas, L. (vulg. *coquelicot*). m. j.ᵗ V. *B.* flore albo. — V. C. flore roseo. V. *D.* flore purpureo, (nobis). Les variétés *B.* et *C* à Brunhamel, Dohis; la variété *D* auprès d'Auvillers. Une autre variété, couleur de chair, se trouve entre Lagny et la forêt de Bouvresse.

P. somniferum, L. (vulg. *pavot*). j.ⁿ j.ᵗ subspontané.

Chelidonium majus, L. (vulg. *éclaire*). m. s. Haies, décombres.

FUMARIÉES.

Corydalis bulbosa, Pers. (m.ˢ av.). La forêt de Coucy.

Corydalis digitata, Pers. (m.ˢ av.). A Lagny, dans une haie.

Fumaria officinalis, L. (vulg. *fumeterre*). m. s. Champs.

F. parviflora, Lam. (j.ⁿ j.ᵗ). Les champs cultivés, à Chivre, entre Clermont et Bussy, Assy et Remy; les montagnes de Larbroye et de Lagny.

F. Vaillantii, Lois. (m. j.ᵗ). Entre Laon et Presle.

F. media, Lois. (j.ⁿ j.ᵗ). Montagne de Laon, les moissons à Salmoucy, Chivre; assez fréquente à Erlon, Dercy, Crécy-sur-Serre; les environs de Noyon.

F. capreolata, L. (j.ⁿ s.). A Athies.

F. densiflora, DC. (j.ⁿ). Entre Remy et Assy?

CRUCIFÈRES.

Raphanus sativus, L. (*le radis cultivé*). j.ⁿ j.ᵗ

R. raphanistrum, L. (m. j.ⁿ). Champs, prés. (vulg. *ravenelle*).

Brassica oleracea, L. (*le chou* et ses variétés). m. j.ⁿ

B. rapa, L. *rave, rabioule, navet.* (m.)

B. Napus, L. *le colzat, la navette d'hiver.* (m.)

Sinapis nigra, L. V. *B.* S. torulosa, Pers. (j.ⁿ j.ᵗ). A Cuiry-lès-Yviers. On trouve dans les mêmes lieux la V. *D.* S. villosa.

S. arvensis, L. (vulg. *sené, jotte*). m. j.ⁿ Champs.

Diplotaxis muralis, DC. (m. j.ᵗ). A Charleville, dans les fentes des murs.

Sisymbrium officinale, Scop. (vulg. *herbe au chantre, vélar*). m. j.ᵗ Lieux incultes.

S. irio, L. (av. a.ᵗ). Murs, chemins.

S. sophia, L. (vulg. *sagesse des chirurgiens*). m. j.ⁿ Murs, toits, lieux incultes. Manque auprès de Vervins et de Rocroy.

Digitized by Google

Erysimum cheiranthoides, L. Les environs de Laon, très commun à Crécy-sur-Serre; auprès de Noyon. (j.ⁿ j.ᵗ).

E hieracifolium, L. Les endroits sablonneux du marais de Chivre. (j.ⁿ j.ᵗ).

Conringia thaliana, Rchb. (av. m.). Murs, champs.

Alliaria officinalis, Andrz. BG. (av. m.). Haies et buissons.

Hesperis matronalis, L. A Bailly. (m. j.ⁿ).

Cheiranthus cheiri, L. (av. m.). vulg. *violier jaune, giroflée.* Les vieux murs.

Barbarea vulgaris, R. Brown. (m.). Les lieux humides.

Barbarea præcox, R. Brown, (av. m.). Les bois de Malvaux, Hirson, les environs de Rocroy.

Turritis glabra, L. (m. j.ⁿ). Bois et prés secs à Laon, Noyon. Elle manque dans l'arrondissement de Vervins et ne se retrouve qu'auprès de Fumay.

Arabis hirsuta, Scop. A. sagittata, DC. V. *C.* A. hirsuta glastifolia, Rchb. (m. j.ⁿ). Lieux pierreux, prairies; la V. *C* auprès de Revin.

Dentaria pentaphyllos, L. (m. j.ⁿ). Les bois à Laniscourt, près l'ancien ermitage?

Cardamine pratensis, L. av. j.ᵗ (vulg. *cresson des prés*). Prés humides. *C.*

C. amara, L. (m.). Lieux ombragés et humides.

C. hirsuta, L. V. *A.* sylvatica. La forêt d'Aubenton. (j.ⁿ).

C. impatiens, L. (m. j.ⁿ). Les bois entre Prémontré et Brancourt; à Monthermé.

Nasturtium officinale, R. Brown. (m. j.ᵗ). vulg. *cresson de fontaine.* Eaux claires, ruisseaux.

N. sylvestre, R. Brown. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux incultes, humides et même arides, auprès de Laon, Noyon, Givet.

N. palustre, DC. (j.ⁿ a.ᵗ). Lieux inondés.

N. amphibium, R. Brown. Lieux aquatiques. (m. j.ᵗ).

Isatis tinctoria, L. (vulg. *guède*) m. j.ⁿ V. *B.* hirsuta. l'espèce dans les moissons entre Laon et Mons-en-Laonais; la variété *B* à Lamalmaison, Sissonne, Boncourt.

Neslia paniculata, Desv. (m. j.ⁿ). Les moissons à Liesse, Sissonne, Beaurieux, Vigneux, Rumigny.

Camelina sativa, Crantz. (m. j.ᵗ). Cultivée. Se trouve souvent parmi le lin: connue dans la Thiérache sous le nom de *faux lin.*

Cochlearia armoracia, L. (vulg. *grand raifort, moutarde des Allemands*). m. j.ⁿ Montagne de Laon.

Alyssum montanum, L. (m. j.ⁿ). Lieux montueux près Laon.

A calycinum, L. (m. j.ⁿ). Lieux arides à Laon, Noyon.

Draba verna, L. (m.ˢ m.). Champs, murs, prés secs.

Capsella bursa pastoris, Vent. (m.ˢ d.). Décombres, chemins, champs.

Lepidium sativum, L. (vulg. *cresson alénois*). m. j.ⁿ

Digitized by Google

L. campestre, R. Brown. (m. j.ⁿ). Champs.

Senebiera coronopus, Poir. (j.ⁿ a.ᵗ). Champs, murs, sentiers.

Thlaspi perfoliatum, L. Les moissons, à Vigneux, Bossus. (av. m.).

T. arvense, L. (vulg. *monnayère*). m. j.ⁿ. Champs, montagnes.

Teesdalia lepidium, DC. syst. BG. (av. m.). Auprès de Parfondru.

Iberis amara, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les champs.

CISTÉES.

Helianthemum fumana, Mill. (m. j.ᵗ). La montagne St Siméon, près des vignes de M. Cabour.

H. vulgare, Gærtn. (m. a.ᵗ). (*vulg. herbe d'or, fleur du soleil.*) V. *B.* flore pleno. Lieux secs, bords des bois; la V. *B* entre Lislé et Dizy-le-Gros.

H. pilosum, Pers. (j.ᵗ a.ᵗ). Entre Lislé et Dizy-le-Gros.

H. polifolium, Sweet. (j.ⁿ j.ᵗ). Les montagnes St Siméon et de Porquéricourt.

VIOLACÉES.

Viola palustris, L. (m. j.ᵗ). Très commune dans les lieux marécageux aupres de Rocroy.

V. odorata, L. (m.ˢ av.). Haies, bois.

V. hirta, (av. m.). Les environs de Laon, de Noyon.

V. Canina, L. (av. m. et j.ⁿ). V. *B.* V. ericetorum. Schrad.— V. *C.* V. lucorum, Rchb. —V. *D.* V. calcarea. Le mont Blanc près Laon.

L'espèce partout; les deux premières variétés auprès de Rocroy.

V. Riviniana, Rchb. (m. j.ⁿ). Les environs de Rocroy.

V. sylvestris, Lam. (m.ˢ m.). Le parc du château de Cuiry.

V. Ruppii, All. (av. m.). Les environs de Rocroy.

V. lactea, Sm. V. *B.* V. stagnina, Kit. (av. m.). Les bois près de Rocroy.

M. Monnier, de Nancy, prétend que la violette de chien ne produit point de fleurs apétales comme la violette hérissée, etc. Je dois faire observer que le contraire a lieu.

Vers la fin d'août, toutes les tiges de la violette de chien que l'on arrache sont chargées d'un grand nombre de fleurs apétales, et de capsules déjà parvenues à une parfaite maturité. Pour corroborer ce que j'avance, je vais extraire la note suivante que je trouve p. 119, t. I, de la flore française de M. Mutel.

« Toutes les violettes munies d'une tige offrent des indivi-
« dus à fleurs sans pétales; ordinairement les fleurs du prin-
« temps

« temps ont des pétales, et celles de l'été n'en ont pas, mais « sont fertiles. Les vrais caractères spécifiques sont dans la « capsule et la fleur fraîches! les stipules varient. »

Tout le monde sait que l'on doit à MM. Gingins, Bernardin de St Pierre et Monnier la connaissance de la double floraison des violettes acaules à tige courte de la section des *nominium* DC., l'une vernale, dans laquelle les corolles sont bien développées, et les fleurs infertiles; la seconde estivale, dans laquelle les corolles avortent, mais dont les fleurs sont fertiles. Ces fleurs sans corolles, ont cinq étamines presque toujours libres et plus courtes que l'ovaire. Les pédoncules se recourbent très-vite, et enterrent, pour la mûrir, leur capsule qui est fertile.

La violette de chien diffère des espèces acaules de la section des *nominium* en ce qu'elle n'enterre pas ses capsules, et que les fleurs apétales croissent indifféremment sur toutes les parties de la tige, et non au collet de la racine. Quelquefois ces fleurs sans corolles, ont conservé les vestiges d'un ou de deux pétales d'une petitesse extrême.

V. grandiflora, DC. Fréquente dans les prés, les moissons, à Rocroy, Sécheval, le Gué d'Hossus, le Cul des Sarts, Regniowez. (j.ⁿ s.).

V. tricolor, L. (print. et aut.). Les moissons, les champs.

RÉSÉDACÉES.

Reseda phyteuma, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Entre la Malmaison et Amifontaine : fort rare.

R. lutea, L. (vulg. *réséda sauvage*). m. s. Lieux incultes.

R. luteola, L. (vulg. *gaude, herbe à jaunir*). m. j.ᵗ Routes. C.

DROSÉRACÉES.

Drosera rotundifolia, L. (j.t a.ᵗ). Les marais, à Mons-en-Laonais, Parfondru; les endroits marécageux de la rieze de Rocroy.

D. intermedia, Hayne. (j.ᵗ a.ᵗ). Les mêmes localités que la précédente.

D. anglica, Huds. (j.ᵗ a.ᵗ). Le marais de Salmoucy, la rieze de Rocroy au lieudit *le roulier*.

Parnassia palustris, L. (a.ᵗ s.). Lieux humides.

POLYGALÉES.

Polygala vulgaris, L. (m. j.ᵗ). Prés, collines, bords des bois. — V. *D.* obtusifolia, (P. amara, Des.). La rieze de Rocroy. — V. *Y.* P. cæspitosa, Pers. Les lieux arides à Hanapes. — V. *Z.* P. angustifolia, (P. monspeliaca, Vill.). La rieze de Rocroy.

Digitized by Google

P. oxyptera, Rchb. (j.ⁿ j.ᵗ). La rieze de Rocroy.
P. serpyllacea, Weihe. (j.ⁿ j.ᵗ). ibid.
P. amara, L. (m. j.ⁿ). Les pelouses sèches, à Laon, Noyon, Rocroy.
P. uliginosa, Rchb. (m. j.ⁿ). Les lieux marécageux de la rieze de Rocroy.
P. austriaca, Crantz. (m. j.ⁿ). Des lieux arides près Laferée.

CARIOPHYLLÉES.

Gypsophila muralis, L. (j.ⁿ s.). Ça et là dans les champs.
Dianthus prolifer, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Bords des champs et des bois.
D. armeria, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Haies, bois, champs stériles.
D. atrorubens, All. (m. j.ⁿ). Montagne de Laon, vers le Mont Blanc.
D. deltoides, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Le bois de Boncourt.
Saponaria vaccaria, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Fréquente dans les moissons entre La Malmaison et Amifontaine, plus rare à Festieux, dans le canton de Rosoy-sur-Serre et entre Rumigny et Antheny.
S. officinalis, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les vignes, à Noyon, Laon, Mons-en-Laonais, Parfondru, Festieux; les moissons, à Liesse: rare à Fontenelle; les bords de l'Oise, de la Meuse.
Silene otites, Sm. (j.ⁿ j.ᵗ). A Laon, Morgny-en-Haie, Goudelancourt-lès-Bérieux, Eppes, Liesse, entre Sissonne et Boncourt; près de Coucy; entre Blérancourt et Gamelin; sur les montagnes près Cus.
S. inflata, Sm. (j. s.). Champs, collines, montagnes.
S. Conica, L. (m. j.ⁿ). Auprès de Craonne, Montaigu, Sissonne; sur la montagne de Porquéricourt.
S. conoidea, L. (j.ⁿ). A Corbeny.
S. nutans, L. (m. j.ⁿ). Cette plante, commune auprès de Laon, Noyon, manque à Vervins et à Rocroy, et ne se retrouve que sur les rochers à Monthermé, Revin, Fumay, Givet
Lychnis viscaria, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les environs de Laon.
L. flos cuculi, L. (vulg. *fleur de coucou*). V. B. flore albo. (m. j.ⁿ). Les prés. La V. *B* à Morgny-en-Thiérache.
L. dioica, L. (vulg. *compagnons blancs*). m. j.ⁿ Cette plante, fréquente auprès de Laon et de Noyon, cesse de croître à Bussy-lès-Pierrepont, et entre Sissonne et Boncourt. Elle manque complétement à Vervins, Rocroy.
L. sylvestris, Hoppe. (été). Lieux un peu humides, bois. Une variété à fleurs couleur de chair se trouvait jadis au bois du Breuil.
L. githago, Scop. (vulg. *nielle des blés*). j.ⁿ j.ᵗ Moissons. C.
Holosteum umbellatum, L. (av.). Les champs, à Laon, Varesnes, Coucy, etc.

Digitized by Google

Stellaria nemorum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Bois, buissons, à Laon, Ourscamp, etc.

S. media, Vill. (Alsine, L.). av. s. Partout.

S. holostea, L. (m. j.ᵗ). Haies, buissons; partout.

S. glauca, With. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux humides, bois des Essarts près Noyon.

S. graminea, L. V. *B.* intermedia, Gaud. Prés, bords des forêts. V. *B* entre Rumigny et Anthenv. Eté.

Larbrea aquatica, St Hilaire. BG (j.ⁿ j.ᵗ). Les environs de Laon, Noyon, Vervins, Rocroy.

Arenaria segetalis, Lam. (m. j.ⁿ). Les moissons auprès de Laon, Vervins.

A. rubra, L. (m. a.ᵗ). Moissons, champs sablonneux.

A. setacea, Thuil. (j.ⁿ j.ᵗ). Les lieux arides du canton de Rosoy-sur-Serre.

A. tenuifolia, L. (m. j.ⁿ). Lieux sablonneux, murs de clôture. V. *B.* viscidula, Thuil.

A. triflora, L. (m. j.ⁿ). Les environs de Laon.

A. trinervia, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux couverts, bois.

A. serpyllifolia, L. (m. j.ⁿ). Champs, lieux arides, murs.

Elatine hydropiper, L. (a.ᵗ). Les lieux inondés, à Mons-en-Laonais, Coingt, le Cul des Sarts.

E. hexandra, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Au Cul des Sarts.

Sagina procumbens, L. (av. a.ᵗ). Murs, champs sablonneux.

S. erecta. L. (m.). Fréquente à Coingt, Plomion, le grand chemin de Montcornet à Brunhamel, celui de Dagny au Hoquet; les usages d'Hanapes, à Maimbresson, Eteignères.

Spergula arvensis, L. (m. j.ⁿ). Champs sablonneux.

S. pentandra, L. (m. j.ⁿ). Les champs à St Paul-aux-Bois; les lins à Cuiry.

S. nodosa, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les marais, à Urcel, Parfondru, Vauchelles près Noyon, Dohis, Rocroy.

Cerastium semidecandrum, L. (m.ˢ av.). Champs sablonneux, prés, collines.

C. vulgatum, L. V. *B.* glomeratum, Thuill. (av. s.). Prés sablonneux, lieux cultivés. La V. *B* au bois de Genvry.

C. triviale, Link. (av. o.). Lieux cultivés, décombres, routes, murs.

C. aquaticum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les environs de Laon, de Noyon, de Vervins et de Rocroy.

C. arvense, L. (av. s.). Chemins, prés secs.

LINÉES.

Linum catharticum, L. (m. s.). Gazons humides, plaines.

L. usitatissimum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Cultivé.

L. tenuifolium, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les montagnes, à Bruyères, Parfondru, Festieux, Corbeny, St Erme, entre Sissonne et

Digitized by Google

Boncourt, etc. Les montagnes de Caisne, Carlepont.
Radiola linoides, Gm. (j.t a.t). La rieze de Rocroy, la forêt de Coucy.

HYPÉRICÉES.

Hypericum quadrangulum, L. (h. dubium, Leers.). j.t at. Les bois et quelques prairies des environs de Rocroy.
H. tetrapterum, Fries. (j.t a.t). Fossés, prés humides.
H. perforatum, L. (j.t a.t). Haies, lisières des bois.
H. humifusum, L. (jt. s.). V. *B*. H. Liottardi, Vill. Champs et prés sablonneux. La V. *B* dans les bois de St Paul-aux-Bois, la forêt d'Aubenton, triages de *la femme enterrée* et *du bosquet Loiseau*.
H. repens, L. (m. j.n). La forêt des Ardennes près Revin.
H. elodes, L. (j.n j.t). Les lieux marécageux de la rieze près le Cul des Sarts.
H. pulchrum, L. (j.n j.t). V. *B*. flore albido. Les environs de Laon, de Noyon, de Vervins et de Rocroy. La V. *B* forêt des Ardennes.
H. montanum, L. (j.n a.t). Les environs de Laon et de Noyon.
H. hirsutum, L. (j.t a.t). Ibid.

TILIACÉES.

Tilia parvifolia Ehrh. (j.t). Bois montueux.
T. Europæa, L. (j.n j.t). Ibid.
T. platyphyllos, Scop. (j.n j.t). Cultivé autour des villages.

MALVACÉES.

Malva crispa, L. (j.t a.t). Subspontanée à Laon, Bussy-lès-Pierrepont, Crépi.
M. rotundifolia, L. (j.n s.). Champs, décombres. (M. vulgaris, Fries).
M. sylvestris, L. (j.n j.t). Lieux cultivés, décombres. V. *B*. flore albo. La variété *B* à Pont-l'Evêque.
M. moschata, L. (j.t s.). Auprès de Laon, Noyon, Archon, Dohis, les bois de Dolignon, du Val-St-Pierre, d'Hirson, la grande route de Charleville.
M. alcea, L. (j.n s.). Bords des champs, collines, décombres.
M. fasciculata, Cav. (j.n j.t). Subspontanée en 1852 près de Chauny.
Althæa officinalis, L. (j.t s.). Les bords de l'Oise près Ourscamp, à Anisy-le-Château ; subspontanée à Wiège, Camelin, Guny.

Digitized by Google

ACÉRINÉES.

Acer pseudoplatanus, L. Bois, à Liesse, etc. (av. m.).
A. campestre, L. (av. m.). Haies, bois, buissons.
A. platanoides, L. (av. m.). Bois, forêts.

HIPPOCASTANÉES.

Æsculus hippocastanum, L. (vulg. *marronier d'Inde*). av. m.

AMPÉLOPIDÉES.

Ampelopsis quinquefolia, Kern. (j.t a.t). Cultivée surtout pour garnir les murs. (vulg. *vigne-vierge*).
Vitis vinifera, L. (j.n). Cultivée.

GÉRANIACÉES.

Geranium sanguineum, L. (m. s.). Bois montueux depuis Bruyères jusqu'à Parfondru, ceux de Montaigu, montagne de Laon.
G. pratense, L. (m. j.n). Des bois montueux à Montaigu, Veslud, Parfondru.
G. molle. L. (m. a.t). Lieux cultivés, décombres, murs.
G. rotundifolium, L. (m. a.t). Champs, lisières.
G. pusillum, L. (m. a.t). Lieux cultivés, murs, haies.
G. dissectum, L. (m. j.n). Champs cultivés, décombres.
G. columbinum, L. (j.n a.t). Champs, rochers, bois.
G. robertianum, L. (av. a.t). Haies, murs, bois.
Erodium cicutarium, Sm. — V. *A*. Geranium præcox, Cav. V. *B*. G. chærophyllum, Cav. (m. a.t). Les 2 variétés, champs, coteaux.
E. pimpinellifolium, Sm. (j.n s.). Prés, sentiers.

BALSAMINÉES.

Impatiens noli tangere, L. (vulg. *herbe de Ste Catherine*). j.t s. La forêt de Coucy, celle d'Aubenton, triage de *la femme enterrée*, le bois de Thenailles.

OXALIDÉES.

Oxalis acetosella, L. (vulg. *herbe de bœuf, pain de coucou, alleluia*). Les bois et lieux ombragés. Print.

Digitized by Google

CALYCIFLORES.

CÉLASTRINÉES.

Staphyllea pinnata, L. (vulg. *nez coupé, faux pistachier*). m. j^{n}. Subspontané dans un petit bois, voisin de celui de Genvry.

Evonymus Europæus, L. (vulg. *bonnet de prêtre, bois carré*). m. j^{n}. Haies, bois.

Ilex aquifolium, L. (m. j.^{n}). Bois. On en trouve une variété à feuilles panachées au bois des Trémonts.

RHAMNÉES.

Rhamnus catharticus, L. (j.^{n} j.^{t}). Haies, bois. Manque dans les arrondissements de Vervins et de Rocroy.

R. frangula, L. (vulg. *Bourgène, aulne noir*). m. Bois, haies.

LÉGUMINEUSES.

Ulex Europæus, L. (vulg. *Landier, ajonc marin, vigneau*). m.^{s} av. Les environs de Laon; à Beaurains, les Essarts, Guiscard près Noyon; à Guise, Aisonville; la rieze de Rocroy vers le Cul des Sarts.

Spartium scoparium, L. (vulg. *genêt à balais*). m. j^{n}. Très commun dans les taillis, etc.

Genista sagittalis, L. (m. j.^{n}). Les environs de Laon, de Noyon, la rieze de Rocroy et les bois de Couvin.

G. tinctoria. L. (j.^{n} j.^{t}). Prés, collines, bruyères.

G. pilosa, L. (av. m.). Lieux sablonneux, à Mons-en-Laonais, Parfondru.

G. anglica, L. (av. j.^{n}). Les environs de Laon, entre Cus et Caisne, la rieze de Rocroy et les landes de Rumigny.

Cytisus laburnum. L. (vulg. *faux ébénier*). m. subspontané dans les bois à Fontenelle.

Ononis spinosa, L. (vulg. *arrête-bœuf, herbe à l'âne*). Eté. Bords des champs, des fossés. V. *B.* flore albo. A Monthermé.

O. procurrens, Wallr. (j.^{n} a.^{t}). Champs.

O. hircina, Jacq. (j.^{t} a.^{t}). A Parfondru, Agnicourt, Parfondeval.

O. natrix, L. (m. j.^{t}). A Mons-en-Laonais. Chevregny, Bruyères, Craonne, la Malmaison, Morgny-en-Haie, Sissonne; la montagne de Caisne près Noyon.

Anthyllis vulneraria, L. Champs, montagnes. (été).

Medicago lupulina, L. (été). Champs, prés, routes.

Digitized by Google

M. minima, Desr. in Lam. (m. j.ⁿ). Champs, montagnes, collines.

M. falcata, L. (j.ᵗ s.). Bords des champs, prés secs.

M. media, Pers. (j.ⁿ s.). Lieux cultivés, lisières des bois et des champs; souvent mêlée avec la suivante dans le Laonais.

M. sativa, L. (m. a.ᵗ). V. *B.* flore albo, (nobis). La V. *B* auprès de Laon.

Melilotus officinalis, Pers. — M. altissima, Thuil. Lisières des prés, bois.

Trifolium fragiferum, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Prairies, bords des routes.

T. striatum, L. (été). Sur les montagnes, à Mons-en-Laonais, Laniscourt, etc.

T. arvense, L. (vulg. *pied-de-lièvre*). j.ⁿ j.ᵗ Champs et bois sablonneux.

T. incarnatum, L. (vulg. *T. farouche*). V. *B.* T. Molinerii, DC. L'espèce cultivée dans le département de l'Aisne. La V. *B* dans les prés voisins du Mont-Blanc près Laon. (m. j.ⁿ).

T. ochroleucum, L. — V. *B.* saxatile, DC. — V. *Y.* dichotomum, Ser. (j.ⁿ j.ᵗ). L'espèce est assez commune dans les prés entre Laniscourt et Molinchart et sur les montagnes du Noyonnais. Les V. *B* et *Y* croissent, la première, à Eppes, la seconde dans les prés de Brunhamel.

T. pratense, L. (j.ⁿ s.). Prés, champs.

T. sativum, Mill. (j.ⁿ j.ᵗ). Cultivé.

T. medium, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les bois près Noyon, Laon, etc.

T. Rubens, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les montagnes du Laonais.

T. montanum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les bois montueux, à Veslud, Parfondru; les prés, à Mons-en-Laonais, Laniscourt, Molinchart, Presles, le Sauvoire.

T. repens, L. (m. s.). Prés. (vulg. *trioleť*).

T. elegans, Savi. (j.ⁿ a.ᵗ). Les environs de Laon, de Vervins.

T. filiforme, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, prés. *C.*

T. campestre, Schreb. (j.ⁿ s.). Champs, moissons.

T. procumbens, L. (j.ⁿ s.). Lieux secs.

T. agrarium, L. (m. j.ᵗ). Bois, vallées, prairies un peu humides.

Lotus corniculatus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). V. *B.* L. arvensis, Schk. — V. *C.* Tenuifolius, Poll. Prés, coteaux, buissons.

L. altissimus, Des. (été). — V. *B.* L. hirsutus. Lieux humides.

Tetragonolobus siliquosus, Roth. Prés humides, à Mons-en-Laonais, Parfondru, Liesse, etc.; entre Pontoise et Cus. (m. j.ⁿ).

Galega officinalis, L. V. *B.* flore albo. Montagne de Laon, Ardon, Semilly, Clacy, le château de Mailly : V. *B* montagne de Laon. (j.ⁿ s.).

Robinia pseudacacia, L. Subspontané. (m. j.ⁿ).

Digitized by Google

Colutea arborescens, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Subspontané.

Astragallus glycyphyllos, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Les bois, à Mailly, Liesse, Bourguignon, Lizy, Suzy, Prémontré, Folembray; la montagne St Siméon près Noyon.

Coronilla varia, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Assez fréquente auprès de Laon; montage de Caisne près Noyon. Manque à Vervins et à Rocroy.

Ornithopus perpusillus, L. (m. j.ᵗ). Champs sablonneux, au Mont-Blanc près Laon, à Parfondru, entre Cus et Caisne.

Hippocrepis comosa, L. (m. j.ᵗ). Lieux sablonneux.

Onobrychis sativa, Lam. — V. *B.* flore albo, (nobis). m. j.ᵗ vulg. *herbe éternelle, sainfoin*). La variété *B* près de Coucy-le Château.

O. supina, DC. (j.ⁿ j.ᵗ). Les montagnes, à Bruyères, Parfondru, Bièvre, Presles.

Ervum lens, L. (m. j.ⁿ). Les champs.

E. tetraspermum, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Champs maigres, bois, moissons.

E. gracile, DC. (j.ⁿ j.ᵗ). Les moissons à Vireux.

E. monanthos, L. (m. j.ᵗ). Les moissons près Noyon.

E. hirsutum, (m. j.ⁿ). Moissons, bois, buissons.

Vicia cassubica, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, moissons, à Morgny-en-Haie, Urcel, Pierrepont; à l'Epinette près Landouzy.

V. cracca, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, prés, moissons.

V. pseudocracca, Bert. (m. j.ⁿ). Les moissons auprès de Bucilly.

V. tenuifolia, Roth. (j.ⁿ j.ᵗ). Auprès de Laon; entre Aubenton et Logny, Landouzy et la Bouteille, à Hirson, Bucilly.

V. dumetorum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les bois entre Brancourt et Prémontré.

V. lutea, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, prés, moissons.

V. sativa, L. (été). flore albo. — V. *B.* V. segetalis, Thuil. — V. *C.* V. angustifolia, Roth. L'espèce cultivée; la variété à fleur blanche auprès de Vervins. Les V. *B* et *C* les environs de Laon, de Noyon, de Vervins et de Rocroy.

V. sepium, L. V. *B.* flore carneo, (nobis). m. j.ⁿ Bois, haies. La V. *B* bois de Bonne-Fontaine.

V. faba, L. (été). Cultivée.

Pisum sativum, L. (m. j.ᵗ). Cultivé.

P. arvense, L. (vulg. *pisaille, pois de pigeon*). j.ⁿ a.ᵗ).

Lathyrus aphaca, L. (m. j.ᵗ). Moissons et prés.

L. sativus, L. (vulg. *pois carré, pois de brebis*). j.ⁿ j.ᵗ Cultivée.

L. cicera, L. Été. Cultivée.

L. hirsutus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les moissons, à Bucilly, Rumigny; Fontenelle, Antheny, Eteignères, Laval-Morency, Renwez; très rare à Beaurains près Noyon.

L. pratensis, L? Riv. (m. j.ⁿ). Les prés.

L. tuberosus, L. (vulg. *gland de terre, anette*). j.ⁿ j.ᵗ Les moissons, entre Antheny et Auvillers.

Digitized by Google

L. sylvestris, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Bois et prés montueux.

Orobus palustris, Rchb. Lathyrus, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Le marais d'Urcel.

O. niger, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les bois à Montaigu : rare.

O. tuberosus, L. (m. j.ⁿ). Assez fréquent dans les environs de Laon, de Rocroy; les bois de Carlepont près Noyon.

Phaseolus nanus, L. (été). Cultivé : le haricot nain.

P. vulgaris, L. (été). Cultivé.

ROSACÉES.

(Amydalées). Amygdalus communis, L. (fév. m.ˢ). Cultivé : l'*amandier*.

Persica vulgaris, Mill. (m.ˢ av.). Cultivé : *le pêcher*.

Armeniaca vulgaris, Lam. (m.ˢ av.). Cultivé : l'*abricotier*.

Prunus spinosa, L. (vulg. *prunellier*, *épine noire*). av. — V. *B*. P. spinosa, Guimp. Fleurs paraissant en mai — juin, en même temps que les feuilles. L'espèce commune dans les haies; la V. *B* les haies près Rocroy.

P. insititia, L. — V. B. P. sylvatica, Des. (m.). Les haies des environs de Rocroy, où il est assez fréquent, ainsi que la V. *B*. J'ai remarqué que les fleurs geminées de l'espèce se soudaient souvent ensemble, et ne formaient plusqu'une seule fleur dont tous les organes étaient en nombre double.

P. domestica, L. (av. m.). Cultivé : *le prunier*.

Cerasus avium, Mœnch. (av. m.). Les bois.

C. duracina, DC. (av. m.). Cultivé : *le bigarreautier*.

C. caproniana, DC. (av. m.). Cultivé : *le griottier*.

C. juliana, DC. (av. m.). Cultivé : *le guignier*.

C. padus, DC. (m.). Fréquent dans presque tous les bois des environs de Laon, et connu sous le nom de *cor noire*.

(Spiréacées). Spiræa ulmaria, L. — (m. j.ᵗ). V. *B*. Glauca. — V. *C*. denudata. Prés.

S. filipendula, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les prés voisins du bois du Sauvoire.

S. salicifolia, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Subspontanée dans les haies près Rocroy.

(Dryadées). Geum urbanum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Haies, C.

Rubus fruticosus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Haies, bois. C.—V. *B* inermis.

R. tomentosus, Willd. (j.ⁿ). Les bois du canton d'Aubenton, à Coingt.

R. cæsius, L.—V. *B*. flore pleno. (j.ⁿ a.ᵗ). Haies, buissons. La V. *B* bois de Beaulieu.

R. idæus, (m. j.ᵗ). Fréquent dans la forêt d'Aubenton, etc.; rare dans les bois d'Ourscamp et des Essarts.

R. Saxatilis, L. (m.). Les bois de Salmoucy, Liesse, Morgny-en-Haie, Montaigu, Festieux, Veslud, Parfondru.

Fragaria vesca, L. (m. j.ⁿ). Bois, coteaux.

Digitized by Google

F. elatior, Ehrh. (m.). Les haies à Rocroy.

F. grandiflora, Ehrh. (m. j.ⁿ). Subspontané dans quelques haies à Rocroy.

Tormentilla erecta, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Prairies, bords des bois.

Potentilla reptans, L, (j.ⁿ s.). Prés, bords des routes, des fossés.

P. verna, L. (av. m. et rar. s.). Pelouses, coteaux, montagnes.

P. argentea, L. (j.ⁿ). Lieux secs.

P. canescens, Bess. (m. j.ⁿ). A Monthermé sur les murs, à Fumay sur les rochers.

P. inclinata, Vill. (j.ⁿ j.ᵗ). Sur les rochers à Fumay.

P. anserina, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Presque partout.

P. fragariastrum, Ehrh. (av. m.). Bois.

P. Vaillantii, Nestl. (m.). Les bois entre Porquéricourt et les Essarts : rare.

Comarum palustre, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais, à Chivre, Chivi: rare auprès du Cul-des-Sarts, commun dans les endroits marécageux à Sécheval.

Agrimonia eupatoria, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Haies, coteaux. (vulg. *herbe de St Guillaume*).

A. odorata, Camer. (j.ⁿ j.ᵗ). Les lieux couverts, à Noyon, Brunhamel, Rimogne.

(Sanguisorbées). Alchemilla arvensis, Scop. (j.ⁿ a.ᵗ). Champs. (vulg. *petit pied-de-lion*, *perce-pied*).

A vulgaris, L. — V. *B.* Hybrida, auct. L'espèce commune dans les cantons de Rosoy-sur-Serre, la forêt d'Aubenton, plus rare à Hirson et au Val St Pierre; fréquente auprès de Rocroy, surtout la V. *B.* Très rare dans la forêt de St Gobain, entre Prémontré et Suzy. (m. s.).

Poterium sanguisorba, L. (m. a.ᵗ). Champs, prés.

(Rosées). Rosa pimpinellifolia, L. (m. j.ⁿ). La montagne St Siméon près Noyon.

R. cinnamomea, L. (m. j.ⁿ). Subspontané dans les haies à Rocroy.

R. villosa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les environs de Noyon.

R. rubiginosa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). — V. *A.* R. micrantha, Smith. — V. *B.* R. umbellata, Leers. — V. *C.* R. sepium, Thuil. Bords des bois, des champs, haies. La variété *B* entre Rosoy-sur-Serre et St Georges.

R. canina. L. — V. *A.* R. nitens, Des. — V. B. R. glaucescens, Des. — V. C. R. dumetorum, Thuil. — V. *D.* R. obtusifolia, DC. (j.ⁿ j.ᵗ). Haies, buissons. La V. *D* sur la butte de Sauvrezy.

R. gallica, L. (vulg. *rose de Provins*). m. j.ⁿ. Subspontané sur la montagne St Siméon et dans le cimetière du Fréty.

R. repens, Scop. (m. j.ⁿ). Bords des bois.

R. arvensis, Huds. (j.ⁿ). Haies.

Digitized by Google

(Pomacées). Cratægus oxyacantha, L.—V. *B.* flore roseo, (nobis). — V. *C. C.* monogyna, Jacq. (m.) Haies et bois. La V. B près Magny-lès-Montcornet. J'en ai trouvé à Monidée, sur la grande route de Charleville, une monstruosité à fleur double.

Mespilus germanica, L. (m. j.ⁿ). Bois, haies, buissons.

Sorbus torminalis, Crantz. (m. j.ⁿ). Les bois, à Montaigu, Festieux, Fourdrain, Prémontré, Carlepont

S. latifolia, Pers. (m. j.ⁿ). Le grand bois de Chaourse.

S. aria, Crantz. (m.). Commun dans les bois depuis Montaigu jusqu'au delà de Cheret.

S. aucuparia, L. (m.). Bois. vulg. *cormancienne* dans les environs de Vervins.

S. domestica, L. (m.). vulg. *cormier*. Cultivé.

Pyrus communis, L. — V. *A.* P. sylvestris, Lois. (m.). Les haies à Rocroy.

P. Bollwylleriana, DC. (m.). Les haies de la grande route de Rocroy à Fumay.

P. malus, L. (m.). Bois.

P. acerba, DC. (m.). Bois, haies. Planté sur la route de Fumay à Givet : son fruit sert à faire du vinaigre. Les bois de Salmoucy, d'Ourscamp; les haies près de Rocquigny, Rocroy.

Cydonia vulgaris, Pers, (av. m.). *Coignassier*.

CUCURBITACÉES.

Cucumis melo, L. (j.ᵗ s.). Cultivé : *le melon*.

C. sativus, L. (*concombre*, *cornichon*.) j.ᵗ s.

Cucurbita maxima, Duch. (vulg. *potiron*.) j.ⁿ s.

Bryonia dioica, L. (été). Haies. Manque dans tout l'arrondissement de Rocroy.

ONAGRAIRES.

(Œnothères). Epilobium spicatum, Lam. (angustifolium, L.) vulg. *laurier St Antoine*, *osier fleuri*. Eté. Fréquent auprès de Vervins, Rocroy; plus rare à Laon; les bois d'Ourscamp et de Varesnes.

E. hirsutum, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Bords des eaux.

E. parviflorum, Schreb. E. molle, Lam. (j.ⁿ j.ᵗ).—V. *B.* E. intermedium, Mérat. Lieux humides. La V. *B* forêt d'Aubenton.

E. montanum, L. — V. *B* collinum, Gmel. — V. *C.* lanceolatum. — V. *D.* verticillatum. Bois montueux : la V. *B* sur les murs et dans les lieux secs; la V. *C* dans les lieux pierreux; la V. *D* dans le parc du château de Cuiry : fort rare. (j.ⁿ j.ᵗ).

E. tetragonum, L. V. *B.* flore albo. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux humides ou inondés ça et là. La V. *B* près de Noyon.

E. palustre, L.—V. *B.* flore albo, (nobis). j.ⁿ j.ᵗ Les endroits

Digitized by Google

marécageux auprès de Rocroy. La V. *B* dans les marais de la Somme près St Quentin.

Œnothera biennis, L. (vulg. *herbe aux ânes*). Les bois, à Liesse, Eppes, Corbeny, Prémontré; les bords du canal de l'Oise, jadis dans le bois du Breuil.

(Jussiées). Isnardia palustris, L. Auprès de Mons-en-Laonais; fréquente dans les cantons de Rosoy-sur-Serre et d'Aubenton; dans la rieze de Rocroy. (j.t s.).

Circæa lutetiana, L. (vulg. *herbe de St Étienne, herbe aux magiciennes*). j.n a.t Lieux humides et ombragés.

(Trapacées). Trapa natans, L. (vulg. *châtaigne d'eau*). j.n j.t A Genlis, sur l'étang de l'ancienne abbaye.

HALORAGÉES.

(Myriophyllées). Myriophyllum spicatum, L. (j.n j.t). Fossés aquatiques, tourbières.

M. verticillatum, L. (j.t a.t). Auprès de Laon, sur la Serre entre Agnicourt et Pontséricourt.

(Hippuridées). Hippuris vulgaris, L. (vulg. *pin d'eau, queue de cheval*). j.n j.t Fossés aquatiques, rivières à Laon, Noyon, etc.

(Callitrichinées). Callitriche verna, L (vulg. *étoile d'eau*). m. j.t Mares et fossés.

C. autumnalis, L. (été). Ruisseaux, rivières, eaux courantes. Ces plantes offrent de nombreuses variations.

CERATOPHYLLÉES.

Ceratophyllum submersum, L. (j.n j.t). Fossés, eaux tranquilles.

C. demersum, L. (j.n j.t). Fossés, mares, étangs.

LYTHRARIÉES.

Lythrum salicaria, L. (j.t s.). Bords des fossés, des ruisseaux.

L. hyssopifolium, L. (j.n j.t). Montagne de Laon.

Peplis portula, L. (j.n j.t). Les environs de Laon.

PORTULACÉES.

Portulaca oleracea, L. (été). Lieux pierreux, vignes.

Montia fontana, L. (m. j.t). — V. *B*. M. major. Les marais, à Mons-en-Laonais, Parfondru; l'espèce et la V. *B* à Maubert-Fontaine, Rocroy, Revin, Fumay.

PARONYCHIÉES.

(Illécébrées). Herniaria glabra, L. (vulg. *herniole, turquette, herbe du Turc, herbe au cancer*). j.n j.t Lieux sablonneux.

Digitized by Google

H. hirsuta, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les mêmes lieux que la précédente.
Paronychia argentea. Lam. (m. j. ⁿ). Les rochers à Monthermé ?
Scleranthus perennis, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs sablonneux.
S. annuus, L. (j.ⁿ s.). Ibid.

CRASSULACÉES.

Sedum rubens, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les vignes entre Clacy et Monsen-Laonais.
S. telephium, L. — V. *B.* purpureum, Fuchs. (j.ᵗ a.ᵗ). Murs et rochers. La V. *B* sur les rochers entre Fumay et Givet.
S. cepæa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les haies à Larbroye.
S. sexangulare, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les rochers, à Monthermé, Revin, Fumay, Givet.
S. acre, L. (vulg. *vermiculaire brûlante*). j.ⁿ j.ᵗ Les murs, les toits, etc.
S. reflexum, L. (j.ᵗ). Rochers, vieux murs.
S. album, L. — V. *B.* S. micranthum, DC. (vulg. *trique-madame, petite joubarbe*). Vieux murs. La V. *B* sur les rochers entre Fumay et Givet. (été).
Sempervivum tectorum, L. (été). Sur les toits, les murs.
S. montanum, L. (été). Montagne de Laon.

GROSSULARIÉES.

Ribes uva crispa, L. (av.). Haies.
R. alpinum, L. (av. m.). Sur la montagne St Siméon près Noyon.
R. rubrum, L. (av. m.). Cet arbrisseau est assez commun dans les bois, à Nampcelle près Vervins, Brunhamel, Guise; il devient plus rare dans ceux des environs de Noyon.
R. nigrum, L. (av.). Rare dans les bois au Pas Bayard près Hirson.

SAXIFRAGÉES.

Saxifraga aizoon, Murr. (j.ⁿ). Les rochers à Monthermé.
S. tridactylites, L. (av. m.). Vieux murs.
S. granulata, L. (m. j.ⁿ). Prés, bois.
Chrysosplenium alternifolium, L. (m.). La forêt d'Aubenton, les bois des Nuées, de Bonne-Fontaine, de St Michel, Hirson; ceux de Fourdrain.
C. oppositifolium, L. (m.). Les mêmes localités que la précédente; la forêt de St Gobain.

Digitized by Google

(Hydrocotylées). Hydrocotyle vulgaris, L. (vulg. *écuelle d'eau*). j.ⁿ j.ᵗ Les marais, à Chambry, Chivre, Liesse, Vesle, Fourdrain, Chivi; près Ourscamp et Bailli; les endroits marécageux des environs de Vervins; la rieze de Rocroy, les bois de Beaulieu.

(Saniculées). Sanicula Europæa, L. (vulg. *herbe St Laurent*). m. j.ⁿ Bois ombragés.

Eryngium campestre, L. (vulg. *herbe à cent têtes, chardon-roland*). j.ᵗ s. Lieux incultes.

(Smyrniées). Conium maculatum, L. (vulg. *ciguë, grande ciguë*). j.ⁿ j.ᵗ Fréquente sur la montagne de Laon, plus rare à Coucy-le-Château, Chauny. Se trouve aussi au Tambour près Aubenton, entre Bossus et Fontenelle.

(Scandicinées). Scandix pecten Veneris, L. (m. j.ⁿ). vulg. *herbe aux chevilles*. Champs.

Anthriscus vulgaris, Pers. (m. j.ⁿ). Montagne de Laon, de Coucy-le-Château.

A. cerefolium, Hoffm. (m. j.ⁿ). Cultivé : *le cerfeuil*.

Chærophyllum sylvestre, L. (m. j.ⁿ). Haies, prairies, buissons.

C. temulum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Haies, lieux incultes, buissons.

(Amminées). Cicuta virosa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais, à Pierrepont, Vesle, Fourdrain.

Apium graveolens, L.—V. *B. A.* dulce. (vulg. *célevi*). j.ⁿ j.ᵗ La V. *B* subspontanée dans une rue à Morgny en Thiérache.

Petroselinum sativum, Hoffm. (vulg. *le persil*). juin. Subspontané dans les murs du château de Cuiry.

Trinia glauca, Rchb. (T. vulgaris DC.) A Morensy. (m. j.ⁿ).

Helosciadium inundatum, Kock. (m. j.ⁿ). Le marais de Parfondru.

J'ai récolté, auprès de Mons-en-Laonais, plusieurs échantillons d'une variété de *l'helosciadium inundatum*, qui, quoique parvenus à une parfaite fructification, n'avaient qu'un à deux pouces; ils étaient mêlés avec *l'elatine hydropiper*.

H. repens, Koch. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais, à Chambry, Chevregny, Cour le Moine près Chevresis, Licz, Guny, presque tous ceux des environs de Noyon.

H. nodiflorum. Koch. (j.ⁿ j.ᵗ). Fossés, marais, ruisseaux.

Ægopodium podagraria, L. (vulg. *podagraire, herbe aux goutteux*). j.ⁿ j.ᵗ Haies, jardins, vergers.

Carum carvi, L. (m. j.ⁿ). Les prés, à Cuiry, Dohis, Brunhamel, Aubenton, Hanapes, Blanchefosse, Rocroy. J'ai trouvé une seule fois sur la montagne de Tarlefesse près Noyon, une variation de cette plante à involucre et involucelle composés de folioles semblables aux radicales mais plus petites.

Digitized by Google

C. verticillatum, Koch. (j.ⁿ a.ᵗ). Fréquent dans les endroits marécageux près Rocroy.

Bunium bulbocastanum, L. (vulg. *terre-noix*). j.ⁿ j.ᵗ Les moissons, à Bérieux, Béhéricourt, Dolignon, Magny, Renneval, Rumigny, Antheny, etc.

Pimpinella saxifraga, L.—V. *B. P.* nigra. Willd. Pelouses, coteaux secs. La V. *B* dans la forêt de Salmoucy et auprès de Rocroy. (j.ⁿ s.).

P. magna, L. — V. *B.* dissecta, Retz. (m. s.). Près un peu humides des plaines et des montagnes.

On trouve fréquemment dans la partie de l'arrondissement de Vervins qui avoisine l'Ardenne, et dans le canton de Rosoy-sur-Serre, une variété du *pimpinella magna*, ou plutôt, je pense, une espèce bien distincte, qui y remplace entièrement l'espèce ordinaire. Les feuilles radicales fort amples sont ailées, à folioles ovales en coin, pinnatifides, dentées en scie; les supérieures réduites aux gaines. Sa tige s'élève quelquefois à cinq pieds. Je l'ai aussi observée dans les environs de St Pol (Pas de Calais). J'en ai trouvé une variété à fleurs rouges dans le parc du château de Cuiry.

Sium latifolium, L. (vulg. *cresson sauvage ou bâtard*). j.ⁿ j.ᵗ Les marais, à Fourdrain, Guny, les étangs de Danisy, les bords de l'Oise.

S. angustifolium, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Fossés, marais.

Buplevrum falcatum, L. (j.ᵗ a.ᵗ). vulg. *oreille de lièvre, herbe à la gaine.* Haies. Manque dans l'arrondissement de Vervins et auprès de Rocroy; ne reparaît qu'à Givet.

(Sésélinées). Æthusa cynapium, L. (vulg. *petite ciguë*). j.ⁿ s.—V. *B.* Æ. segetalis, Bœnnigh.—V. *C.* Æ. elata, DC. Lieux cultivés, décombres, bois, haies.

Fœniculum officinale, All. (j.ᵗ a.ᵗ). Montagnes de Laon, de Coucy-le-Château.

Œnanthe fistulosa, L. vulg. *filipendule aquatique*). j.ⁿ jᵗ. Les marais des environs de Laon et de Noyon.

Œ. Lachenalii, Gm.—V. *B.* approximata, Mérat. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais, à Presles, Etouvelles.

Œ. peucedanifolia, Poll. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais de Chivi, celui d'Uvé près Noyon.

Œ. pimpinelloïdes, L. (j.ᵗ). Les marais, à Laon, Noyon.

Œ. phellandrium, Lam. (vulg. *ciguë aquatique*). j.ᵗ a.ᵗ Les marais et fossés aquatiques, à Laon, Noyon; manque auprès de Rocroy.

Seseli montanum, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les montagnes, à Mons-en-Laonais, Laniscourt, Nouvion-le-Vineux, etc.

S. glaucum, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les mêmes lieux que le précédent.

S. elatum, L. (j.ᵗ). La montagne de Parfondru, celle de Porquéricourt près Noyon.

Digitized by Google

S. bienne, Crantz. (a.ᵗ s.). Les montagnes, à Mons-en-Laonais, Brie, Fourdrain, etc. Le bois de Salmoucy; les montagnes de Porquéricourt et de Tarlefesse près Noyon.

Libanotis montana, All. (j.ᵗ a.ᵗ). Les bois, à Salmoucy, Liesse; le rocher de Charlemont près Givet; la montagne de Porquéricourt près Noyon.

Silaus pratensis, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les prés.

(Angélicées). Selinum carvifolia, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Les bois à Chivi, Parfondru, Coingt, Logny, Hirson; ceux de Bonne-Fontaine et des environs de Rocroy; les prés de Carlepont.

Angelica sylvestris, L. (j.ᵗ a.ᵗ). vulg. *angélique sauvage*. Le long des ruisseaux, prés humides, bois.

(Peucédanées). Thysselinum palustre, Hoffm. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais, à Chambry, Chivi, Etouvelles; très commun dans celui de Salmoucy et dans plusieurs endroits de la forêt; plus rare dans ceux de Liesse, Chivre.

Peucedanum officinale, L. (vulg. *queue de pourceau, fenouil de porc*). j.ⁿ j.ᵗ Dans les Ardennes, les bois de Brunhamel.

P. gallicum, Tourn. Latour. (P. parisiense, DC.). a.ᵗ s. La montagne St Siméon près Noyon.

Heracleum sphondylium, L. (vulg. *branc-ursine*). m. s.— V. *B*. H. sphond. stenophyllum, Gaud. Prés. La V. *B* les prés entre Hanapes et Bossus.

Pastinaca sativa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Prés, bords des champs. V. *B*. P. domestica, Lob. Cultivée

(Tordylinées). Tordylium maximum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les environs de Laon.

(Thapsiées). Laserpitium gallicum, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les montagnes et les bois, à Parfondru, Veslud, Festieux, Morgny-en-Haie, Montaigu.

(Daucinées). Daucus carota, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Prés, champs.

Orlaya grandiflora, Hoffm. (Caucalis, L.). Les moissons, à Eppes, Morgny-en-Haie, Parfondru, Sissonne, (rare entre Chivre et Bussy), Aubenton, Logny, St Michel, Rumigny, Antheny, Auvillers. (j.ⁿ j.ᵗ).

(Caucalinées). Caucalis daucoides, L. (m. j.ⁿ). Les moissons, à Presles, Lagny, Bossus.

Torilis infesta, Hoffm. (j.ᵗ a.ᵗ) Champs, moissons, etc.

T. anthriscus, Gmel. (j.ⁿ a.ᵗ). Champs, décombres, haies.

ARALIACÉES.

Adoxa moschatellina, L. (av. m.). Haies, vergers, bois couverts.

Hedera helix, L. (s. o.). Le long des murs, autour des arbres.

CAPRIFOLIACÉES.

Digitized by Google

CAPRIFOLIACÉES.

(Caprifoliées). Lonicera periclymenum, L.—V. *B.* Quercifolia. (j.ⁿ j.ᵗ). Haies, bois. La V. *B* fréquente dans les cantons de Rosoy-sur-Serre et d'Aubenton.

L. xylosteum, L. (m. j.ⁿ). Fréquent dans presque tous les bois des environs de Laon, dans ceux de Dolignon, Vigneux, Chaourse.

(Sambucinées). Viburnum lantana, L. (vulg. *mancienne*). m. Les haies, les bois.

V. opulus, L. (vulg. *obier*). m. j.ⁿ Haies, bois.

Sambucus ebulus, L. (vulg. *yèble*). j.ⁿ j.ᵗ Bords des champs et des fossés.

S. nigra, L. — V. *B.* S. laciniata, Guimp. — V. C. S. virescens, Desf. (j.ⁿ j.ᵗ). L'espèce dans les haies; la V. *B* montagne de Laon; la V. C les haies de Vigneux.

S. racemosa, L. (av. m.). Les bois de Thenailles, du Val-St-Pierre, d'Hirson, Aubenton; les environs de Rocroy, de Givet et les bords de la Meuse.

(Cornées). Cornus mascula, L. (*cornouiller, cormier*). m.ˢ av. Cet arbre assez commun auprès de Laon et de Noyon, surtout dans les bois de Salmoucy et de Carlepont, manque à Vervins et à Rocroy.

C. sanguinea, L. (vulg. *bois punais*). j.ⁿ j.ᵗ Haies et bois.

LORANTHÉES.

Viscum album, L. (*le gui*). m.ˢ av. Parasite sur les pommiers, les peupliers, etc.

RUBIACÉES.

Rubia tinctorum, L. (vulg. *garance*). j.ᵗ a.ᵗ Montagne de Laon, derrière la préfecture.

Galium cruciata, Scop. (vulg. *croisette*). av. m. Haies, champs.

G. palustre, L.—V. *B.* G. debile, Desv. (été). Marais. La V. *B* Marais des environs de Rocroy.

G. uliginosum, L. (été). Les marais. — V. *B.* G. spinulosum, Mérat. La V. *B* les marais, à Chambry, Mons-en-Laonais.

G. sylvestre, Poll. — V. *B.* G. montanum, Vill. — V. C. G. Bocconi, All. La V. *B* La rieze et les bois de Rocroy; la V. C entre Lislé et Dizy-le-Gros, auprès de Morensy. (j.ⁿ j.ᵗ).

G. mollugo, L. V. B. G. scabrum, With. —V. C. G. elatum, Thuil. — V. D. G. aristatum, DC. Prés, coteaux; la V. C bois humides; la V. D les environs de Noyon.

Digitized by Google

G. verum, L. (vulg. *caille lait*). j.ⁿ j.ᵗ Champs, prés, collines.

G. divaricatum, Lam. (j.ⁿ a.ᵗ). Les montagnes du Laonais.

G. parisiense, L. — V. *B.* G. anglicum, Huds. (j.ⁿ a.ᵗ). Auprès de Moransy.

G. tricorne, With. (j.ⁿ a.ᵗ). Les moissons à St Paul au Bois.

G. aparine, L. (vulg. *gratteron*). j.ⁿ a.ᵗ Haies, champs.

G. spurium, L. —V. *B. G.* Vaillantii, DC. (été). Les moissons.

Asperula arvensis, L. Les moissons, à Montaigu, Sissonne, Boncourt, Clermont, etc. (m. j.ⁿ).

A. cynanchica, L. (vulg. *herbe à l'esquinancie*). j.n j.t Lieux sablonneux.

A. odorata, L. (vulg. *reine des bois, petit-muguet, hépatique étoilée* ou *des bois*). m. j.ⁿ Bois.

Sherardia arvensis, L. (j.ⁿ s.). Champs.

VALÉRIANÉES.

Valeriana officinalis, L. — V. *B.* exaltata, Mik. (m. j.ᵗ). Bois, bords des fossés.

V. dioica, L. (av. m.). Prés humides, marais.

Valerianella olitoria, Mœnch. (vulg. *mâche, doucette*). m.ˢ av. Champs, moissons.

V. carinata, Lois. (av. m.). Lieux cultivés.

V. dentata, Willd. (av. m.). Champs, moissons. — V. *B.* mixta, DC. plus rare.

V. eriocarpa, Des. (av. m.). Les moissons à Rumigny.

DIPSACÉES.

Scabiosa arvensis, L. (vulg. *herbe aux sabotiers*). — V. *B.* S. sylvatica de plusieurs auteurs. — V. *C.* flore albo, (nobis). m. s. Champs, bois; la V. *C* sur la montagne de Parfondru.

S. sylvatica, L. (été.) Bois.

S. suaveolens, Desf. (j.ᵗ s.). Auprès de Barenton-Bugny.

S. columbaria, L. (j.ⁿ s.). — V. *B.* flore albo, (nobis). Bords des champs, coteaux : la V. *B* le Mont-Blanc près Laon.

S. lucida, Vill. (j.ⁿ j.ᵗ). Les bords de la Meuse à Revin, Fumay.

S. succisa, L. (vulg. *mors du diable*). Été et automne. — V. *B.* S. glabrata, Schott. — V. *C.* flore albo. Prairies, bois.

Dipsacus pilosus, L. (vulg. *verge à pasteur*). j.ⁿ s. Fréquent à Folembray, La Fère, plus rare à Prémontré, Laon, Hirson; à Passel, Dreslincourt, Noyon.

D. sylvestris, Mill.—V. *B.* flore albo, (nobis). j.ᵗ s. Champs, bords des routes. La V. *B* montagne de Laon.

Digitized by Google

Eupatorium cannabinum, L. (vulg. *eupatoire d'Avicenne*). — V. *B.* flore albo. (j.t a.t). Bords des fossés : la V. *B* moulin du Mont-Renaud.

Tussilago farfara, L. (vulg. *pas-d'âne, herbe de St Quirin*). m.s av. Terres argileuses.

T. petasites, DC. (vulg. *chapelière, herbe-aux-teigneux*). m.s m. —V. *A.* hermaphrodita. —V. *B.* femina. (T. hybrida, L.). Le bord des ruisseaux à Morgny-en-Haie, Chauny, Résigny, Trans, Noircourt, Aubenton, Fontenelle, Hanapes, Cornaux, St Michel, Hirson, Sécheval.

Cineraria spatulæfolia, Gmel. (m. j.n). Le marais de Chivre.

Senecio vulgaris, L. (m. o.). Lieux cultivés.

S. viscosus, L. (j.n a.t). Les environs de Laon, de Noyon.

S. sylvaticus, L. (j.n a.t). Les environs de Laon ; les bois d'Ourscamp près Noyon ; la forêt des Ardennes.

S. erucæfolius, DC. (j.t s.). Les environs de Laon, Noyon, Vervins, Rocroy.

S. jacobæa, L. (vulg. *herbe St Jacques, jacobée*). j.n j.t — V. *B.* S. aquaticus, DC. Bords des champs, des bois, prés; la V. *B* environs de Noyon.

S. paludosus, L. (j.n j.t). Les marais, à Chambry, Chivi, Etouvelles, Liesse, les endroits marécageux de la forêt de Salmoucy; les bords de la Meuse entre Revin et Fumay, à Montigny, Vireux.

S. Fuchsii, Gmel. Les bois, à Festieux, Liez : rare.

S. nemorensis, L. (j.t a.t). Les bois entre Bourguignon et Montarsène, entre Prémontré et Suzy.

S. sarracenicus, L. (j.t a.t). Fréquent à Hirson, le Nouvion, St Michel, Wattigny, Brunhamel, la forêt des Ardennes près Rocroy. J'en ai trouvé une monstruosité dont toutes les fleurs s'étaient métamorphosées en feuilles.

Arnica montana, L. vulg. *Benoîte des montagnes, tabac des Vosges*; connue auprès de Rocroy sous les noms d'*herbe au prêcheur* (sans doute à cause de la disposition de ses fleurs), *de tabac de prêcheur*. (j.n). Fréquente dans la rieze et les bois de Rocroy, Beaulieu. J'en ai observé une tige ornée de deux fleurs soudées par la base de leurs involucres.

Aster amellus, L. — V. *B.* flore albo, (nobis). Les bois à Mailly, Chevregny, Nouvion-le-Vineux; les montagnes et les bois, entre Bruyères et Parfondru, à Veslud, Festieux : cesse de croître entre Morgny-en-Haie et Montaigu. La V. *B* près Parfondru, (a.t s.).

Erigeron canadense, L. (j.t a.t). Décombres, murs, cours.

E. acre, L. (m. s.). Lieux secs, chemins.

Solidago virga-aurea, L. (j.t. s.). — V. *B.* nodiflora (plante

Digitized by Google

broutée). — V. *C.* umbellata (plante piquée). V. *D.* S. minuta, Vill. Les bois : la V. *B* près d'Urcel; la V. *C* dans les environs de Laon; la V. *D* sur les montagnes du Laonais.

Conyza squarrosa, L. (j.t a.t). Bords des fossés.

Inula helenium, L. (vulg. *aunée*). j.t a.t A Morgny-en-Haie, entre Pontoise et Caisne; les environs de Rocroy.

I. squarrosa, L. (j.t a.t). Les montagnes à Mons-en-Laonais, Laniscourt; des bois montueux, à Brie, Fourdrain, Veslud, Parfondru, Festieux, Mailly.

I. britannica, L. — V. *B.* comosa, (j.t s.). Les bords de l'Oise, de la Meuse : la V. *B* près Revin.

I. salicina, L. (j.t a.t). Les prés entre Corbeny et Craonne.

I. pulicaria, L. (j.t s.). Lieux inondés l'hiver, bords des chemins.

I. dysenterica, L. (vulg. *herbe de St Roch*). j.t a.t Fossés.

Gnaphalium luteo-album, L. (j.t a.t). Entre Leully et Vorges, à Liesse, à la rue d'Orroire près Noyon.

G. sylvaticum, L. (j.t a.t). Les bois.

G. uliginosum, L. (j.t a.t). Lieux inondés l'hiver.

G. dioicum, L. (vulg. *pied-de-chat*). m. Lieux montueux : fréquent dans la rieze de Rocroy.

Filago germanica, L. (vulg. *herbe à coton*). j.t a.t Champs et lieux incultes.

F. montana, L. (j.t a.t). Les lieux arides du canton de Rosoy-sur-Serre.

F. arvensis, L. — V. *B. G.* minimum, DC. (j.t a.t). Plaines sablonneuses, collines; la V. *B* entre Rumigny et Atheny.

F. gallica, L. (j.t a.t). Champs maigres.

Bidens cernua, L. (a.t s.). Marais, fossés.—V. *B.* minima, L.

B. tripartita, L. (j.t s.). vulg. *chanvre aquatique, cornuet*). Fossés.

Helianthus tuberosus, L. (a.t s.). vulg. *topinambour*. Subspontané dans les marais de Parfondru.

Xanthium strumarium, L. (vulg. *glouteron, petite bardane*). j.t s. Entre Abbecourt et Manicamp, Ardon près Laon.

Achillea ptarmica, L. (*herbe à éternuer*). j.t a.t Prés humides, bords des ruisseaux.

A. millefolium, L. (vulg. *herbe-aux-charpentiers, herbe à la coupure*). j.n s. Champs, prés.

Anthemis cotula, L. (vulg. *maroute, camomille puante*). j.n j.t Champs, lieux cultivés.

A nobilis, L. (j.n a.t). Collines et prés secs,

A arvensis, L. (j.n j.t). Champs.

Matricaria chamomilla, L. (m.j.t). Champs, lieux cultivés.

Chrysanthemum segetum, L. (vulg. *marguerite dorée*). Les moissons, entre Auvillers et Monidée, à Renwez, Sécheval, Revin, Vireux, Aubrives, etc.; rare dans la forêt des Ardennes près Revin et sur les bords de la Meuse.

Digitized by Google

C. leucanthemum, L. (vulg. *marguerite des prés, grande paquerette*). m. s. V. *B.* C. montanum, L. Prés, champs. La V. *B* auprès de Rocroy, entre Lislé et Dizy-le-Gros. J'en ai trouvé, dans le parc du château de Cuiry, une monstruosité ornée de deux fleurs réunies ensemble par leur base.

C. corymbosum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Le petit bois d'Archon.

C. parthenium, Pers. (m. a.ᵗ). Champs, décombres. (vulg. *matricaire*).

C. inodorum, L. (j.ⁿ s.). Champs, montagnes, routes.

Bellis perennis, L. (vulg. *petite marguerite*). m.ᵉ n. Prés, collines.

Monstruosités : l'une à neuf pédoncules en ombelle, trouvée entre Rosoy-sur-Serre et Chery; l'autre, remarquable par les longs filets blancs qui s'échappent du milieu du disque, observée dans le parc du château de Cuiry; la troisième, découverte auprès de Rocroy, à fleurettes de l'intérieur de la calathide métamorphosées en feuilles.

Calendula arvensis, L. (vulg. *souci*). j.ⁿ a.ᵗ Fréquent dans les vignes du Laonais.

C. officinalis, L. (j.ⁿ s.). Subspontané près Laon.

Tanacetum vulgare, L. (vulg. *herbe St Marc, herbe aux vers, barbotine*). (j.ᵗ a.ᵗ.). Fossés, routes.

Artemisia absinthium, L. (vulg. *absinthe*). j.ᵗ a.ᵗ Le rocher de Charlemont près Givet : rare. Subspontanée à Lizy, Bussy-lès-Pierrepont, Clermont.

A. camphorata, Vill. V. *B.* subcanescens, Balb. (a.ᵗo.) Commune, ainsi que la V. *B* sur le rocher de Charlemont près Givet.

A. abrotanum, L. (vulg. *citronelle, garderobe*). Cultivée dans les jardins.

A campestris, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Fréquente auprès de Laon; sur la montagne de Caisne, à Camelin, Coucy-le-Château. — V. *B.* nana. Le Mont-Blanc près Laon.

A. vulgaris, L. (vulg. *herbe à cent goûts*). j.ᵗ s. Décombres, murs, routes.

(Cynarocéphales). Centaurea jacea, L. — V. *B.* C. collina, Fl. Wett. (vulg. *herbe du centaure*). Lieux incultes, bords des champs et des bois. Eté.

C. nigrescens, Willd. — (j.ᵗ s.). V. *B.* C. decipiens, Thuil. Auprès d'Aubenton.

C. nigra, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Prés, bois.

C. cyanus, L. (vulg. *bleuet*). Eté. — V. *B.* flore violaceo, (nobis). Les blés. La V. *B* à Rumigny.

C. montana, L. (m. a.ᵗ). La forêt des Ardennes près Revin.

C. scabiosa, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Bords des champs, des bois.

C. solstitialis, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les champs à Molinchart.

C. calcitrapa, L. (vulg. *chardon étoilé*). j.ᵗ a.ᵗ Les lieux incultes.

Digitized by Google

Arctium lappa, L. — V. *A.* A. majus, Gm. — V. *B.* A. minus, Schk.—V. *C.* A. tomentosum, Schk. (j.ⁿ a.ᵗ). Les lieux incultes.

Onopordon acanthium, L. (vulg. *chardon acanthin, pédane*). j.ᵗ a.ᵗ Cette plante, commune auprès de Laon et de Noyon, cesse de croître a Marle, Bussy-lès-Pierrepont et Sissonne, manque auprès de Vervins et de Rocroy, et ne reparaît qu'à Givet.

Serratula tinctoria, L. — V. *A.* integrifolia. — V. *B.* heterophylla. — V. *C.* pinnatifida. — V. *D.* flore albo. (j.ᵗ a.ᵗ). Bois un peu humides. La V. *A* près Noyon; les V. *B* et *C* dans les environs de Laon, de Rocroy; la V. *D* les bois de Montaigu.

Silybum marianum, Gærtn. (vulg. *chardon marie*). j.ⁿ j.ᵗ Très commun sur la montagne de Laon; plus rare à Noyon, St Paul-aux-Bois.

Carduus tenuiflorus, Smith. (j.ⁿ j.ᵗ). Décombres, bords des routes.

C. pycnocephalus, L. (m. j.ⁿ). Montagne de Laon, Royaucourt St Julien.

C. crispus, L. (j.ᵗ s.). Chemins, bois.

C. acanthoides, L. (j.ᵗ a.ᵗ). V. *B.* flore albo, (nobis). Bords des routes. La V. *B* les rives de la Serre près Agnicourt.

C. nutans, L. (j.ⁿ j.ᵗ). V. *B.* flore albo. Bords des chemins. La V. *B* à Dercy.

Cirsium palustre, Scop. (j.ⁿ a.ᵗ). Les marais à Laon, Rocroy.

C. lanceolatum, Scop. (j.ⁿ a.ᵗ). — V. *B.* flore roseo, (nobis). Chemins, lieux incultes. La V. *B* à Pargny-lès-Bois.

C. anglicum, Lob. (j.ⁿ j.ᵗ). Les prés humides à Laon, Noyon.

C. acaule, Allion. (j.ᵗ a.ᵗ). — V. *B.* flore albo, (nobis). Lieux incultes. La V. *B* sur les montagnes situées entre Lizy et Montarsène.

C. eriophorum, Scop. (vulg. *chardon-aux-ânes*). j.ᵗ a.ᵗ Bords des champs, à La Fère, Sempigny et Beaurains près Noyon; Guise, Vigneux, Rumigny, Fontenelle, Bossus, Rimogne.

C. arvense, Lam. (vulg. *chardon hémorrhoïdal*). j.ⁿ a.ᵗ Dans les moissons, les lieux incultes.

C. oleraceum, Allion. — V. *B.* Cnicus paludosus, Lois. (j.ⁿ s.). Prés humides. La V. *B* le marais d'Urcel.

C. tataricum, Allion. (j.ᵗ a.ᵗ). Lieux humides des montagnes entre Bruyères et Parfondru : rare.

Cynara cardunculus, L. (vulg. *carde, cardon d'Espagne*). Cultivé.

C. scolymus, L. (vulg. *artichaut*). Cultivé en grand près Noyon.

Carlina vulgaris, L. (j.ᵗ s.). Lieux secs et pierreux.

(Chicoracées). Cichorium intybus, L. — V. *B.* flore albo.

Digitized by Google

— V. *C*, flore roseo. (j.ⁿ j.ᵗ). Bords des chemins. La V. *B* assez fréquente : la V. *C* rare entre Crécy-sur-Serre et Mortier.

C. endivia, L. (été). Cultivée.

Lapsana communis, L. (vulg. *herbe aux mamelles*). j.ⁿ j.ᵗ Champs, lieux cultivés.

L. minima, Lam. (m. j.ⁿ). Lieux sablonneux.

Prenanthes muralis, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les bois, à Laon, Chiry, Aubenton, Revin, Monthermé, route de Givet.

Chondrilla juncea, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Coteaux secs, à Parfondru, Dominois, etc.

Lactuca sativa, L. (j.ᵗ a.ᵗ) Cultivée.

L. scariola, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Bords des champs, lieux escarpés.

L. virosa, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les environs de Laon, de Noyon.

L. saligna, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Montagne de Laon ; à Cus, Larbroye.

L. perennis, L. Les environs de Laon de Noyon, de Vervins. (j.ⁿ j.ᵗ).

Sonchus oleraceus, L. — V. *B*. S. lævis, Vill. — V. *C*. S. asper, Vill. Les lieux cultivés. (m. n.).

S. palustris, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les marais, à Noyon, à Etouvelles près Laon, les bords de la Meuse.

S. arvensis, L. (été). Parmi les moissons.

Taraxacum officinale, Mœnch. — V. *B*. T. lævigatum, DC. V. *C*. T. palustre, DC. (av. s.). L'espèce partout. La V. *B* entre Sissonne et Montaigu : la V. *C* auprès de la forêt de Salmoucy. J'ai trouvé à Bussy-lès-Pierrepont une tige de *taraxacum*, terminée par deux calathides dont les involucres étaient soudés ensemble.

Crepis fœtida, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Décombres, routes, champs.

C. virens, L. — V. *B*. diffusa, DC. — V. *C*. C. stricta, DC. (j.ⁿ j.ᵗ). Les prés, les moissons.

C. tectorum, L.—V. *B*. C. Lachenalii, Spack. (été). Champs, prés secs.

C. biennis, L. — V. *B*. flosculosa, (nobis). m. j.ⁿ Prés. J'ai observé la V. *B*, remarquable par ses fleurs flosculeuses, à Fontenelle.

Hieracium murorum, L. — V. *B*. H. pictum, Pers. — V. *C*. H. sylvaticum, Willd. (h. Lachenalii, Gmel.). —V. *D*. H. lævigatum, Willd. (vulg. *pulmonaire des Français*). j.ⁿ j.ᵗ Murs, bois, montagnes. La V. *D* forêt des Ardennes près Rocroy.

H. umbellatum, L.—V. *B*. autumnale.—V. *C*. uniflorum. (a.ᵗ s.). Bois, coteaux. La V. *C* les lieux secs, la rieze de Rocroy.

H. sabaudum, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les environs de Rocroy.

H. pilosella, L. (vulg. *pilosette, oreille-de-souris*). m. a.ᵗ — V. *B*. H. Peleterianum, Mér. Prés, coteaux. La V. *B* dans la rieze de Rocroy.

H. auricula, L.—V. *B*. uniflorum. (m. j.ⁿ). Champs, coteaux.

Hypochæris radicata, L. (m. a.ᵗ). Champs, prés.

H. glabra, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Au Mont-Blanc près Laon, à Parfondru.

Digitized by Google

Thrincia hirta, Roth. Prés, lieux stériles.

Leontodon autumnalis, L. (j.t o.). Prés, lisières, collines.

L. major, Mér. (L. hispidum, Thuil.). j.n j.t Prés secs et humides.

J'ai trouvé à Montaigu, dans une allée du parc du château de Cuiry et auprès de Rosoy-sur-Serre, une variété du *L. major*, dont la tige était surmontée de deux calathides très rapprochées l'une de l'autre.

Picris hieracioides, L. (a.t s.). Champs, lieux arides.

Scorzonera hispanica, L. (vulg. *scorzonère, salsifix*). Cultivé.

S. plantaginea, Schleich. (m. j.n). — V. *B.* graminifolia, Roth. Prés et bois humides, à Laon, Noyon, Rocroy; la V. *B* à Noyon.

Tragopogon pratensis, L. (vulg. *barbe de bouc, salsifix des prés*). m. j.n — V. *B.* T. undulatus, Thuil. Prés; V. *B* lieux secs.

T. major, L. (m. j.n) Montagne de Laon, à Eppes, assez fréquent sur la montagne de Crépi; entre Rumigny et Antheny.

T. porrifolius, L. (m. j.n). Fort rare sur la montagne St Siméon près Noyon, lieudit *la cavée*.

CAMPANULACÉES.

(Campanulées). Jasione montana, L. (j.t a.t). — V. *B.* flore albo. Les environs de Laon, de Noyon et de Rocroy: la V. *B* bois d'Ourscamp.

Phyteuma spicatum, L. (vulg. *raiponce*). m. j.n La variété à fleur blanchâtre est fréquente aux environs de Laon, dans les bois de Dagny, Chaourse, des Nuées, Hirson, Beaurain près Guise. Elle disparaît entièrement dans la forêt d'Aubenton, les bois de Bonne-Fontaine, Résigny, Rocquigny, Laferée, où la variété à fleur bleue devient très commune. Dans les environs de Rocroy la variété à fleur blanchâtre est beaucoup plus fréquente que celle à fleur bleue.

J'ai remarqué que les deux variétés ne croissaient jamais ensemble dans les diverses localités ci-dessus mentionnées.

Prismatocarpus speculum, l'Hérit. (vulg. *miroir de Vénus*). j.n j.t Les moissons.

P. hybridus, l'Hérit. (m. j.n). Les moissons, à Montaigu, Sissonne, Boncourt, Chaourse, Leuze, Fontenelle.

Campanula medium, L. (j.n j.t). Les bois, à Montaigu, Salmoucy, Morgny-en-Haie, Veslud, Festieux, Parfondru; rare près Revin, plus commune entre Fumay et Givet.

C. cervicaria, L. (j.t). La forêt des Ardennes près Rocroy.

C. glomerata, L.—V. *B* hirta vel hispida. — V. *C.* farinosocinerea (salviæfolia, Vallr.). — V. *D.* floribus per caulem sparsis, Mapp. (C. aggregata, Panzer). — V. *E.* major. caule

Digitized by Google

2 — 3 ped. alt. — V. *F.* minima. (j.ⁿ j.ᵗ). Coteaux, prés secs. La V. *F* sur les montagne du Laonais.

C. trachelium, L. (vulg. *gants de Notre-Dame*). — V. *B.* C. urticæfolia, Schmidt. — V. *C.* flore albo. L'espèce, bois, coteaux; la V. *B* bois de Berlise; la V. *C* près Fumay.

C. rapunculoides, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Vient spontanément dans le jardin de M. Hannonet, à Noyon.

C. persicifolia, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Le bois de la Tombelle près Noyon.

C. rapunculus, L. (vulg. *raiponce*). m. a.ᵗ Champs, bois taillis, coteaux. J'en ai observé une variété à fleurs blanches à Caisne.

C. rotundifolia, L. (été). — V. *B.* flore albo. — V. *C.* tenuifolia, Hoffm. — V. *D.* linifolia, Vill. Lieux secs. La V. *B* auprès du Cul-des-Sarts; la V. *D* entre Agnicourt et Ponséricourt.

J'ai trouvé dans la forêt des Ardennes, près Rocroy, une monstruosité de *campanula rotundifolia*, dont la tige aplatie était ornée de trois fleurs. Deux d'entre elles avaient une corolle régulière, mais à dix lobes, au lieu de cinq; les organes sexuels étaient aussi en nombre double. La troisième fleur avait conservé la forme primitive.

M. de Candolle dit qu'il a vu dans l'herbier de M. de Jussieu une monstruosité de la jasione vivace, dont la tige était également élargie et comprimée. Ce fait, suivant lui, tend encore à prouver l'analogie des campanulacées et des chicoracées. (Flore française, t. III, p. 718, 2ᵉ éd.).

VACCINIÉES.

Vaccinium myrtillus, L. (vulg. *raisin des bois*). av. m. Très commune auprès de Rocroy : rare dans la forêt des Trémont près Thieripré; les bois de Montaigu, Festieux, Fourdrain près Laon; ceux de Lagny, de Béhéricourt près Noyon.

V. oxycoccos, L. (vulg. *canneberge, coussinet*). j.ⁿ j.ᵗ). Les endroits marécageux de la rieze de Rocroy, lieudit *le rouilly*, Sévigny-la-Forêt, le Gué d'Hossus.

ERICINÉES.

Pyrola minor, L. (m. j.ⁿ). forêt des Ardennes près Sécheval.

P. rotundifolia, L. (m. j.ⁿ). La forêt de Coucy; les bois, à Bourguignon, Caisne, Cuy, Boncourt; ceux du Val-St-Pierre, des Trémonts, de la Neuville-aux-Joutes, la forêt des Ardennes.

Erica vulgaris, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Bois, taillis, coteaux secs.

E. tetralix, L. (m. a.ᵗ). La rieze de Rocroy et la forêt des Ardennes; les environs de Laon.

Digitized by Google

MONOTROPÉES.

Monotropa hypopitys, L. (été). Les bois de Carlepont.

COROLLIFLORES.

JASMINÉES.

Ligustrum vulgare, L, (m. j.^{n}). Haies.

Syringa vulgaris, (av. m. *le lilas*). Subspontané au bois de Varesnes, etc.

Fraxinus excelsior, L. (av. m.). Bois, vergers.

F. ornus, L. (av. m.). Subspontané à Moransy.

APOCYNÉES.

(Asclépiadées). Cynanchum vincetoxicum, R. Brown. (asclepias, L.). *herbe aux poux*. (j.^{n} j.^{t}). Les montagnes du Laonais; celle de St Siméon près Noyon; les rochers qui bordent la Meuse, à Revin, Fumay, Givet; entre Chimay et Marienbourg.

(Vincées). Vinca minor, L. (*la pervenche*). av. Haies, bois.

GENTIANÉES.

Menyanthes trifoliata, L. (vulg. *trèfle d'eau*). av. m. Les environs de Laon, de Noyon, de Vervins et de Rocroy.

Chlora perfoliata, L. (j.^{n} j.^{t}). Les montagnes des environs de Laon et de Noyon : fort rare entre Moransy et le bois de Chaourse.

On trouve à Morgny-en-Haie, dans des endroits marécageux, près la butte du moulin à vent, une variété du *chlora perfoliata*, qui ne fleurit qu'à la fin d'août, ou au commencement de septembre. Serait-ce le *chlora serotina*, Koch?

Gentiana cruciata, L. (j.^{t} a.^{t}). Les montagnes de Laon, Béhéricourt, Chiry; les bois du Sauvoire, de Parfondru, Salmoucy, Liesse, Salency.

G. pneumonanthe, L. (a.^{t} s.). Fréquente dans les marais et les prairies humides du Laonais (J'ai observé la variété à fleur blanche au marais de Chivre, ainsi que la V. *uniflora*); la montagne de Béhéricourt et les prés de Carlepont près Noyon. L'espèce disparaît dans l'arrondissement de Vervins, mais l'on trouve, entre Coingt et Jeantes, la variété à feuilles plus étroites, qui croît dans les montagnes. Cette

Digitized by Google

dernière est très commune dans la rieze et les bois de Rocroy, où l'espèce devient très rare.

G. campestris, L. (s.). Les environs de Laon, la montagne St Siméon,

G. germanica, Willd. — V. *B.* G. uniflora, Willd. — V. *C.* flore albo, (nobis). L'espèce sur les montagnes du Laonais et des environs de Noyon; à Vigneux, Ebouleau, Chaourse. La V. *B* sur les montagnes de Lizy, Brie, Crépi; la V. *C* sur la montagne de Lizy.

J'ai observé, en 1835, auprès de Vigneux, plusieurs tiges de gentiane dont les corolles, devenues monstrueuses, avaient pris les formes les plus bisarres. L'une de ces tiges était surtout remarquable par son aplatissement.

Erythræa centaurium, Pers. — V. *B.* flore albo. (vulg. *petite centaurée*). j.t a.t Les bois. La V. *B* Bois de Genvry.

E pulchella Fries. — V. *B.* flore albo — V. *C.* flore carneo, (nobis). — V. *D.* ramosissima, Thuill. V. *E.* gentiana palustris, Lam. Les V. *B* et *E* aux environs de Noyon; la V. *C* dans le marais de Presles.

On trouve sur les montagnes du Laonais une variété peu rameuse, quelquefois même uniflore. (j.n j.t).

E. intermedia, Mérat. (j.n j.t). Les prairies à Cilly près Marle.

CONVOLVULACÉES.

Convolvulus sepium, L. (été). — V. *B.* C. sylvaticus, W. Kit. Haies. La V. *B* dans les oseraies au marais d'Uvé près Noyon.

C. arvensis, L. (été). — V. *B.* corollis profundè quinque partitis, (nobis). Lieux incultes, champs. La V. *B* mêlée avec l'espèce à Antheny, mais fort rare.

Cuscuta Europæa, L. (vulg. *rogne, cheveux de Vénus*). Été. Aux environs de Laon, la cuscute attaque la luserne, tandis que dans l'arrondissement de Vervins on ne la trouve que sur la vesce cultivée, jamais sur le trèfle, et fort rarement sur la luserne. A Marle, au contraire, elle croît sur les trèfles et les féveroles. Je l'ai observée une seule fois sur la pomme de terre au Hoquet, hameau de Vigneux.

C. epithymum, Smith. (été). Parasite sur le thym, les bruyères, etc.

C. epilinum, Weihe. (été). Parasite sur le lin cultivé: fort rare.

BORAGINÉES.

Echium vulgare, L. (vulg. *herbe-aux-vipères*). j.n j.t —

Digitized by Google

V. *B.* flore albo. — V. *C.* flore carneo. Lieux stériles. V. *B* à Sissonne : V. *C* à Auvillers.

Lithospermum officinale, L. (vulg. *herbe aux perles*). m. j.ⁿ Bois secs.

L. arvense. L. (m. j.ⁿ). Champs.

Pulmonaria officinalis, L. (vulg. *herbe aux poumons, h. du tac, h. au lait de N.-D*). av. m. Commune dans les bois du Laonais jusqu'à Boncourt, où elle disparaît.

Symphitum officinale, L. (vulg. *grande consoude*). m. j.ⁿ V. flore albo, roseo et purpureo. Bords des fossés, prairies humides.

Anchusa italica, Retz. (vulg. *langue de bœuf*). j.ⁿ j.ᵗ Assez fréquente sur la montagne de Laon.

Lycopsis arvensis, L. (vulg. *petite buglosse, grippe des champs*). m. j.ⁿ Champs.

Myosotis arvensis, Roth. (vulg. *oreille de souris*). m. j.ⁿ Champs.

M. collina, Ehrh. (m. j.ⁿ) Bois montueux.

M. versicolor, Roth. (m. j.ⁿ). Les environs de Noyon.

M lutea, Pers. (m.). La forêt des Ardennes près Rocroy. (Monteaud).

M. palustris, Withering. — V. *B.* flore albo. (vulg. *ne m'oubliez-pas, vergissmeinnicht*). m. j.ⁿ Marais. La V. *B* forêt d'Aubenton.

M. sylvatica, Ehrh. (m. j.ⁿ). Les bois.

Cynoglossum officinale, L. (vulg. *cynoglosse, langue de chien*). m. j.ⁿ Bords des routes, lieux incultes.

Asperugo procumbens, L. (m. j.ⁿ). Montagne de Laon, derrière la préfecture.

Borago officinalis, L. (été). Lieux cultivés

SOLANÉES.

Lycium europæum, L. (j.ⁿ s.) Les haies, à Presles.

L. barbarum, L. (vulg. *jasminoïde*). j.ⁿ s. Le pont d'Ourscamp, les haies à St Paul-aux-Bois.

S. nigrum, L.—V. *B. S.* humile, Bernh.—V. *C. S.* villosum, Lam. (vulg. *morelle*). j.ᵗ o. L'espèce dans les lieux cultivés : la V. *B* auprès de La Malmaison : la V. *C* à Vauchelles près Noyon.

S. dulcamara, L. (vulg. *douce amère, vigne vierge, vigne de Judée, loque*). Été. V. *B.* flore albo. Haies, bois. La V. *B* forêt de Salmoucy.

S. tuberosum, L. (vulg. *pomme de terre, Canada dans l'Ardenne*). Cultivée. (j.ⁿ j.ᵗ).

Physalis alkekengi, L. (vulg. *herbe à cloques*). Les vignes à Laon. (m. j.ⁿ).

Atropa belladonna, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Très commune au bois du

Digitized by Google

Val St Pierre ; moins fréquente dans ceux de Prémontré, Hirson, Wattigny, Eparcy ; très rare à Rocroy. Se trouve aussi à Dives et Quesmy près Noyon.

Datura stramonium, L. (vulg. *herbe-aux-magiciens, h. du diable, h. à la taupe*). j.t a.t Fréquent sur la montagne de Laon ; au moulin de Genvry, à la chapelle St Médard.

Hyoscyamus niger, L. (vulg. *jusquiame commune, hanebane, potelée, careillade*).). j.n j.t Bords des routes, décombres.

Verbascum thapsus, L. (vulg. *bouillon blanc, molène, herbe à St Fiacre*). — V. *B. V.* angustifolius, Dod. — V. *C. V.* thapsoides, Schrank. (été). Décombres, bords des champs, bois. La V. *B* bois de Mailly : la V. *C* environs de Laon, de Noyon, de Vervins, les bords de la Meuse.

J'ai trouvé dans le bois du Val St Pierre, une variété de *V. thapsoides* qui avait tous les filaments des étamines garnis de poils jaunes (l'espèce a toujours deux étamines glabres).

V. phlomoides, L. (j.n j.t). Les environs de Noyon, le bois du Val.St Pierre.

V. pulverulentum, Vill.—V. *B. V.* floccosum, Kitaibel. (j.n j.t). L'espèce entre Machecourt et Pierrepont ; la V. *B* assez fréquente auprès de Noyon.

V. lychnitis, L. — V. *B.* flore flavo. (j.n j.t). Les environs de Laon, de Noyon. La V. *B.* au bois du Val St Pierre et sur la montagne de Porquéricourt. L'espèce et la V. sur les bords de la Meuse, à Vireux.

V. nigrum, L. — V. *B. V.* parisiense, Thuil.—V. *C. V.* nigro-pulverulentum, Smith—V. *D. V.* nigro lychnitis, Mérat. — V. *E. V.* alopecurus. L'espèce auprès de Laon, Noyon, Guise ; fréquente sur les bords de la Meuse ainsi que plusieurs variétés. La V. *B* à Antheny ; la V. *C* à Salmoucy ; la V. *D* les environs de Noyon, de Laon, de La Fère ; la V. *E* les bords de la Serre, à Agnicourt.

V. blattaria, L. (vulg. *herbe aux mites*). Les rives de l'Oise, à Pontoise, Cus.

PERSONÉES.

(Orobanchées). Orobanche minor, Sutton. (j.n j.t). Croît sur les *gramens, le trèfle des prés*. Dans les environs de Noyon.

O. epithymum, DC. (j.n j.t). Croît sur *le serpolet* à Laon, Noyon, Vigneux, Fontenelle, etc.

O. elatior, Sutton. (j.n j.t). Croît sur *la centurée scabieuse*, quelquefois l'héliantheme, à Noyon, Laon, Fontenelle, etc.

O. rapum, Wallr. (o. major, DC.). Croît sur le genêt à balais, à Noyon, Laon, Rocroy. j.n j.t

O. caryophyllacea, Smith. (o. vulgaris, DC.). Croît sur les racines de l'*aubépine, des rosiers*, à Noyon, Laon. j.n j.t

O. cærulea, Vill. (j.n j.t). Croît sur l'*achillée millefeuille*,

Digitized by Google

à Laon près St Vincent, où elle est fort rare; à Vigneux, Fontenelle, où elle devient beaucoup plus commune.

O. ramosa, L. (j.ⁿ s.). Croît sur le chanvre cultivé. — V. *B.* caule simplici. Cette V. est fort rare sur la route de Chauny près Salency.

Lathræa squammaria, L. (m.). Le bois de Francbertin près Brunhamel.

(Rhinanthées). Melampyrum arvense, L. (vulg. *blé de vache, rougeole, queue de Renard*), j.ⁿ j.ᵗ Les moissons.

J'ai trouvé à Moncornet, entre Rosoy-sur-Serre et Berlise, à Cuiry-lès-Iviers, à Hirson et à Rumigny, plusieurs variétés de cette plante. Dans la première, les fleurs et les bractées sont d'un blanc jaunâtre. La seconde, observée près Hirson, se fait remarquer par ses épis de fleurs, les unes d'un blanc jaunâtre, les autres semblables à celles de l'espèce. La troisième, trouvée auprès d'Agnicourt, est ornée de fleurs d'un pourpre foncé.

M. pratense, L. (j.ⁿ s.). Bois et prés.

M. syvaticum, L. (été). Les bois des environs de Rocroy.

Pedicularis palustris, L. (vulg. *herbe aux poux*). m. j.ⁿ Les marais. J'ai observé la *V.* à fleurs blanches à Vauchelles près Noyon.

P. sylvatica, L. (m. j.ⁿ). Prés et allées des bois; la rieze de Rocroy.

Rhinanthus major, Ehrh. (vulg. *cocréte, créte de coq*). m. j.ⁿ — V. *A. R.* glaber, Lam. — V. *B. R.* hirsutus, Lam. La V. *A* Les prés humides du Laonais, etc; la V. *B* les bois, les moissons.

R. minor, Ehrh. (m. j.ⁿ). Les prés.

R. angustifolius, Gmel. (j.ⁿ j.ᵗ). Les montagnes et les bois à Rocroy, Sécheval.

Euphrasia officinalis, L. (j.ⁿ s.). — V. *B. E.* pratensis, Wimm et Grab. — V. *C.* E. nemorosa (E. stricta, Host). — V. *D. E.* micrantha, Rchb. Prés, coteaux. La V. *C* la rieze et les bois de Rocroy, ainsi que la V. *D.*

E. odontites, L. — V. *B. E.* verna, Bell. (a.ᵗ s. la V. *B.* m. j.ᵗ). Moissons, bords des chemins. La V. à fleurs blanches n'est pas rare dans les environs de Noyon. J'en ai trouvé une monstruosité à tige aplatie au marais de Chivre.

E. lutea, L. (a.ᵗ s.). Les montagnes, à Crépi, Laniscourt, Mons-en-Laonais, Nouvion-le-Vineux; les moissons à Presles; les bois et les montagnes, à Parfondru, Veslud, Festieux; disparaît entre ce dernier village et Morgny-en-Haie. Les montagnes St Siméon, de Béhéricourt et de Porquéricourt près Noyon.

(Antirrhinées). Gratiola officinalis, L. (vulg. *herbe au pauvre homme*). Été. Les environs de Laon.

Digitalis lutea, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Fréquente dans les environs de Givet où le *digitalis purpurea* devient plus rare.

Digitized by Google

D. purpurea, L. (vulg. *gants de Notre-Dame*). j.ⁿ j.ᵗ Très commune dans les bois à Hirson, St Michel, Wattigny, la forêt des Ardennes près Rocroy; plus rare au Nouvion, au Val St Pierre et près Givet; très rare dans la forêt d'Aubenton, triage de carnière. J'ai observé fréquemment la V. à fleur blanche à Hirson et Rocroy.

Scrophularia nodosa, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Fossés, routes.

S. aquatica, L. (vulg. *bétoine d'eau, herbe du siége*). j.ⁿ j.ᵗ — V. *B. S.* appendiculata, Balb.—V. *C.* flore flavo, (nobis). L'espèce sur les bords des rivières, etc, la V. *B* auprès de Noyon et sur les bords de la Serre, etc, la sous variété *C* sur les rives de la Serre près Agnicourt, au confluent du Porcelet dans cette rivière.

La sous variété à fleur jaune de la scrophulaire aquatique n'a encore été observée qu'une seule fois en France, à Cluny (Seine et Loire), dans un fossé de la route vis-à-vis le portail de la papeterie. (Mutel, flore française, t. 2, p. 369); mais, ma sous-variété appartenant à la V. *appendiculata*, est, par conséquent, nouvelle pour la science.

S. vernalis, L. (av. m.). Les environs de Chauny.

Antirrhinum majus, L. (vulg. *mufle-de-veau, gueule-de-lion*). j.ⁿ j.ᵗ — V. *B.* flore albo. Les vieux murs, à Noyon, Laon, Chalandry : la V. *B* entre Chauny et Folembray.

A. orontium, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les champs, à Laon, Noyon, Vervins, Rocroy.

Linaria minor, Desfont. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs sablonneux.

L. cymbalaria, Mill. (j.ⁿo.). Les vieux murs, à La Fère, St Michel.

L. spuria, Mill. (vulg. *velvote*). j.ᵗ a.ᵗ Champs.—V. *B.* grandifolia. A Parfondeval, entre Marle et Marcy.

Cette variété et l'espèce se pélorient très fréquemment dans l'arrondissement de Vervins et le canton de Rosoy-sur-Serre. Les corolles ont cinq ou six éperons. Dans d'autres pélories la corolle est à cinq lobes, mais elle est fendue dans sa partie supérieure, et n'est munie que de trois et même quelquefois de deux éperons. J'ai observé sur plusieurs tiges une pélorie qui, je pense, est encore nouvelle pour la science. La corolle semble, au premier abord, avoir conservé sa forme ordinaire; mais, lorsqu'on l'examine avec attention, on remarque qu'elle est munie de deux éperons, et que la lèvre supérieure, au lieu d'être bifide, comme dans l'état normal, n'a plus qu'un seul lobe, tandis que l'inférieure en a quatre : un seul échantillon m'a procuré une corolle à lèvre supérieure bifide. Sur une tige, ornée d'un grand nombre de fleurs à corolles régulières, j'en ai observé une privée d'éperon, et, du reste, semblable aux autres.

L. elatine, Desfont. (été). Champs.

L. vulgaris, Besl.—V. *B.* L. angustifolia. (L. stricta, Hornem?).—V. *C.* flore albo, (nobis). j.ⁿ j.ᵗ Champs, bords des

Digitized by Google

chemins : la V. *B* auprès de Vervins et de Laon ; la V. *C* sur la montagne St Siméon, dans les bois d'Ourscamp.

L. striata, DC. (été). A la Malmaison, entre Bussy-lès-Pierrepont et Clermont, l'ardoisière de Rimogne.

L. supina. Desfont. — V. *B. L.* Thuillierii, Mérat. (été). Champs sablonneux ; la V. *B* dans les moissons entre Vesles et Frémont.

Veronica hederæfolia, L. (av. m.). Champs.

V. agrestis, L. — V. *B. V.* polita, Fries. — V. *C. V.* opaca, Fries. (av. m.). Les lieux cultivés.

V. præcox, Allion. (m.s av.). Les environs de Laon et de Noyon.

V. triphyllos, L. (m.s m.). Champs sablonneux, murs.

V. verna, L. (m.s av.). Environs de Laon.

V. arvensis, L. (av. m.). Champs.

V. serpillifolia, L. — V. *B.* humifusa, Dickson. (av. s.). Lieux sablonneux : la V. *B* lieux inondés l'hiver. J'en ai trouvé une variété à fleur blanche.

V. spicata, L. (j.n j.t). La forêt de St Gobain.

V. officinalis, L. (vulg. *véronique mâle, thé d'Europe*). — V. *B. V.* repens, DC. Bois secs et montueux : V. *B* rieze de Rocroy.

V. chamædrys, L. (m. j.n). Partout.

V. scutellata, L. (m. j.n). Marais.

V. anagallis, L. (été). Fossés.

V. beccabunga, L. (vulg. *beccabunga*). Eté. Fossés.

V. prostrata, L. (vulg. *véronique des prés, germandrée bâtarde*). m. j.n V. *B. V.* saturejæfolia, Poit. et Turp. — L'espèce dans les pâturages. La V. *B* auprès de Laon.

V. teucrium, L. (m. j.n). Coteaux secs.

(Linderniées). Limosella aquatica, L. (j.t a.t). Les lieux inondés l'hiver, à la rue d'Orroire près Noyon, lieudit *le Jonquoy* ; auprès du calvaire de Sempigny.

LENTIBULARIÉES.

Pinguicula vulgaris, L. (m. j.n). Assez commune dans les marais du Laonais, à Chivre, Pierrepont, Parfondru, Corbeny, etc. Les prés de Cus, sur la montagne St Siméon, dans des endroits humides. Manque dans les marais de Rocroy.

Utricularia vulgaris, L. (j.n j.t). Les eaux stagnantes, à Chambry, Chivre, etc. A Ourscamp près Noyon.

U. intermedia, Hayne. (j.n j.t). Les environs de Laon ; à Pontoise près Noyon.

LABIÉES.

(Menthées). Lycopus europæus, L. — V. *B. L.* incanus, C. Bauh. (vulg. *marrube aquatique, pied-de-loup*). j.t s. Le bord des eaux. La V. *B* auprès de Mons-en-Laonais.

Mentha arvensis, L. — V. *B. M.* lanceolata, Becker. — V. *C. M.*

Digitized by Google

M. parietariæfolia, Beck.—V. *D. M.* præcox, Sole.—V. *E. M.* diffusa, Lej. (a.t s.). Champs, fossés. V. *C* marais.

M. aquatica, L. (j.t a.t). vulg. *baume*. Marais et bords des eaux.

M. rotundifolia, L.—V. *B. M.* crispa, L. (vulg. *baume sauvage*). j.t a.t Lieux humides.

M. sylvestris, L. (vulg. *herbe - aux - pyramides*). j.t a.t Les prés humides.

M. viridis, L. (j.t a.t). Au Mont-Renaud près Noyon.

M. pulegium, L. (vulg. *pouliot*). j.t a.t Lieux humides.

(Saturéiées). Origanum vulgare, L. (vulg. *origan, marjolaine des haies*). j.t a.t Les lieux montueux. La V. à fleur blanche sur la montagne St Siméon.

Thymus serpillum, L.—V. *B. T.* angustifolius, Pers.—V. *C. T.* citriodorus, C. Bauh. (j.n j.t). Lieux secs arides. La V. *B* à Mons-en-Laonais; la V. *C* montagne de Laon.

(Mélissées). Melissa calamintha, L. (vulg. *calament de montagne*). j.t a.t La montagne de Laon; le Mont-Renaud près Noyon.

M. acinos, Benth. (Thymus, L.). Eté. Lieux secs et pierreux.

M. officinalis, L. (vulg. *mélisse, citronnelle, herbe du citron*). j.n j.t Au Mont-Renaud.

Clinopodium vulgare. L. (été). Lieux montueux, bords des bois. La V. à fleur blanche près Noyon.

(Stachydées). Melittis melissophyllum, L. (vulg. *mélisse des bois*). m. j.n Le bois St Paul.

Lamium maculatum, L.—V. *B. L.* lævigatum, L? Les bords de la Meuse, à Monthermé, Deville, Fumay, Montigny, Aubrives.

L. album, L. (vulg. *ortie blanche*). av. m. et j.t s. Haies. C.

Le 29 novembre 1858, j'ai observé dans le potager du château de Cuiry, une monstruosité de *lamium album*, bien propre à fixer l'attention des naturalistes.

La corolle qui avait totalement disparu, était remplacée par cinq dents aiguës qui simulaient un second calice, avec cette différence néanmoins que le véritable calice était encore à deux lèvres, tandis que celui qui remplaçait la corolle, était régulier et à cinq lobes. De ce dernier s'échappaient quatre étamines soudées ensemble, libres seulement à leur sommet, toutes de la même grandeur et privées de leurs anthères; en sorte qu'au premier abord on eût pu les prendre pour une corolle monopétale quinquelobée, surmontée d'un style à deux, quelquefois trois stigmates, dans celles de ces fleurs monstrueuses qui possédaient encore l'organe femelle, car dans plusieurs il se laissait désirer.

Cette précieuse monstruosité, par sa corolle devenue quinquelobée, non seulement confirme les observations de MM. Henri de Cassini et Alfred Moquin, sur la régularité primitive des

Digitized by Google

corolles irrégulières; mais prouve encore, par la métamorphose de ses pétales, que ces organes ne sont que des feuilles modifiées par des sucs plus élaborés.

« Que la plante croisse, fleurisse ou porte des fruits, dit « l'illustre Goethe, ce sont pourtant toujours *les mêmes or-* « *ganes* qui remplissent les intentions de la nature avec des « destinations diverses et sous des formes souvent très modi- « fiées. Le même organe qui sur la tige s'est étalé sous l'état « de feuilles et a pris les formes les plus diverses, se con- « tracte ensuite en un calice, s'élargit de nouveau en pétales, « se contracte pour produire l'étamine et se dilate enfin une « dernière fois pour passer à l'état de fruit. » (De la métamorphose des plantes, p. 97).

L. purpureum, L. (m. s.). Lieux cultivés.

L. hybridum, Vill. (m.) Les lieux cultivés à Varesnes près Noyon : rare.

L. amplexicaule, L. (av. m. a.^{t} s.) Champs, murs.

L. galeobdolon, Crantz. (m.). Haies, bois. (vulg. *ortie jaune*).

Galeopsis ladanum, L. — V. *B. G.* intermedia, Vill. Champs. La V. *B* auprès de Givet. (j.^{t} a.^{t}). vulg. *ortie rouge*.

G. ochroleuca, Lam. (g. dubia, Leers). La forêt des Ardennes à Revin, Anchamps, Vireux. (j.^{t} a.^{t}). A Anchamps on trouve les V. à fleurs légèrement purpurines ou blanches.

G. tetrahit, L. (j.^{t} a.^{t}) Lieux cultivés, bois, haies.

Betonica officinalis, L. — V. *B.* stricta, Ait. (vulg. *bétoine*). j.^{t} L'espèce très commune : La V. *B* dans les environs de Laon, de Vervins et de Givet. J'en ai observé une V. à fleur blanche au bois de Genvry près Noyon, et, au bois de Parfondru, une monstruosité dont l'épi était métamorphosé en feuilles.

Stachys arvensis, L. (été). Champs; très commune dans le canton de Rosoy-sur-Serre.

S. annua, L. (j.^{t} a.^{t}). Champs.

S. recta, L. (vulg. *crapaudine*). Eté. Champs sablonneux ou stériles.

S. germanica, L. (j.^{n} j.^{t}). Auprès de Chevresis-le-Meldeux, entre Laferté et Nouvion-l'Abbesse; à Noyon, sur la grande route de St Quentin et auprès du bois de Genvry; assez commune à Vireux, Givet.

S. alpina, L. (j.^{n} j.^{t}). Rare dans les bois, à la Malmaison, Lagny; plus commune dans la forêt de Bouvresse; se trouve aussi dans celle des Ardennes, à Revin, Haybes, Aubrives.

S. palustris, L. (vulg. *ortie morte*). j.^{n} j.^{t} — V. *B. S.* segetum, Hagemb. — V. *C. S.* ambigua, Smith. (S. palustri-sylvatica, Schiede). L'espèce sur les bords des fossés; la V. *B* dans les moissons; la V. *C* dans les bois d'Hirson.

Digitized by Google

S. sylvatica, L. (vulg. *ortie puante*). j.ⁿ j.ᵗ Bois, haies. J'en ai observé une variété à fleur verte dans les bois de Brunhamel et de Chéry-lès-Rosoy.

Ballota nigra, L. (vulg. *marrube noir*). j.ⁿ j.ᵗ Lieux incultes, murs.

Leonurus cardiaca, L. (vulg. *herbe-aux-tonneliers*), j.ⁿ j.ᵗ Les environs de Laon, de Noyon, de Rocroy.

(Marrubiées). Marrubium vulgare, L. (vulg. *marrube blanc, herbe aux crocs*). j.ⁿ j.ᵗ Bords des routes.

(Népétées). Nepeta cataria, L. (vulg. *herbe-aux-chats*). j.ⁿ s. La montagne de Laon, les environs de Noyon.

Glechoma hederacea, L. (vulg. *lierre-terrestre*). m. j.ⁿ Lieux humides, haies.

(Scutellariées). Prunella vulgaris, L. —V. *B.* P. parviflora, Poir. (j.ⁿ j.ᵗ) Prés, champs stériles. La V. *B* à Monceau-le-Wast.

J'ai trouvé auprès de St George-lès-Rosoy, une monstruosité de cette plante, qui est des plus remarquables. Les trois lobes de la lèvre inférieure se sont métamorphosés en trois pétales, dont les deux latéraux sont presque avortés, tandis que celui du milieu a pris un grand accroissement.

P. laciniata L. (j.ⁿ j.ᵗ). Prés montueux à Noyon, etc.

P. grandiflora, Jacq.—V. *B.* P. pinnatifida, Gaud. (été). Fréquente sur les montagnes, à Mons-en-Laonais, Lizy, Laniscourt, Bruyères, Parfondru, etc.; se trouve aussi à la Malmaison, Pierrepont, Athies, et dans les bois de Salmoucy. La V. *B* à Mons-en-Laonais.

Scutellaria galericulata, L. (vulg. *grande toque*). Eté. Les environs de Laon, de Noyon, de Vervins et de Rocroy.

S. minor, L. (j.ᵗ a.ᵗ). —V. *B.* S. intermedia, Bast. L'espèce et la variété sont très communes auprès de Rocroy, tandis que le *scutellaria galericulata* y devient assez rare.

(Bugulées). Ajuga chamæpitys, Schreb. (m. j.ⁿ). Les lieux secs, à Presles, Nouvion-le-Vineux, Laval, Vorges, Liesse, etc.; les montagnes de Tarlefesse et de Larbroye près Noyon.

A. genevensis, L, (m. j.ᵗ). Les montagnes de Béhéricourt et de Caisne.

A. pyramidalis, L. (m. j.ᵗ). Les lieux arides, à Noyon; assez commune auprès de Laon. Manque dans les arrondissements de Vervins et de Rocroy.

A. reptans, L. (av. j.ⁿ). Bois, prés. J'en ai observé deux variétés, l'une à fleur blanche, l'autre à fleur rose.

Teucrium scorodonia, L. (vulg. *sauge des bois, germandrée sauvage*). Eté. Bois secs.

T. botrys, L. (vulg. *germandrée femelle*). Eté. Les environs de Laon et de Noyon. Manque à Vervins et à Rocroy. J'en ai trouvé une variété à fleur blanche sur la montagne de Tarlefesse près Noyon.

Digitized by Google

T. chamædrys, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les montagnes, à Bruyères, Parfondru, Crépi, Mons-en-Laonais, Noyon; à Barenthon-sur-Serre. Manque à Vervins, Rocroy, et ne se retrouve qu'auprès de Givet.

J'ai observé, entre Bruyères et Parfondru, une variété de cette plante qui me paraît nouvelle. La tige, beaucoup plus élevée et plus robuste que celle de l'espèce, est abondamment couverte de poils; ses feuilles, plus larges, sont fortement crénelées; le calice et la lèvre inférieure de la corolle sont très velus. Serait-ce la variété signalée par M. Mutel, flore française, t. III, p. 572?

T. scordium, L. (vulg. *germandrée aquatique*, *scordium*). Eté. Les marais, à Chivi, Presles, Molinchart.

T. montanum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). — V. *B*. T. supinum, L. L'espèce et la V. assez communes sur les montagnes du Laonais et celles de St Siméon et de Porquéricourt près Noyon.

Sur une tige de *Teucrium montanum* cueillie sur la montagne de Thierny, j'ai observé une corolle qui, ayant cessé d'être labiée, formait une corolle régulière à dix lobes assez profonds: le calice avait le même nombre de lobes.

(Monardées). Salvia pratensis, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Prés. Manque à Vervins, Rocroy; reparaît auprès de Givet.

J'ai trouvé à Sempigny une tige de *salvia pratensis* dont les feuilles caulinaires, au lieu d'être lancéolées acuminées, étaient orbiculaires et surmontées d'une longue pointe.

S. sclarea, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Vulg. *sclarée*, *orvale*, *toute-bonne*. Les vignes du côté d'Ardon.

VERBÉNACÉES.

Verbena officinalis, L. (vulg. *herbe sacrée*). j.ⁿ j.ᵗ Bords des routes.

PRIMULACÉES.

(Primulées). Primula veris officinalis, L. (vulg. *fleur de coucou*). av. m. Prés.

Les primevères disparaissent auprès de Rocroy. La primevère officinale y est tellement rare que je n'en ai encore rencontré qu'un seul pied dans les prés.

P. elatior, Jacq. (av. m.). Prés et bois montueux.

P. grandiflora Lam. (av. m.). Les environs de Laon, de Noyon.

Cyclamen europæum, L. (vulg. *pain de pourceau*). s. o. Les bois de Carlepont. Observé une seule fois dans les prés.

Anagallis arvensis, L. — V. *A*. A. phœnicea, Lam. —V. *B*. flore albo margine sanguineo. — V. *C*. A. cærulea, Schreb.— V. *D*. flore violaceo, (nobis). Les V. *A* et *C* fréquentes; la V. *B* sur la montagne de Tarlefesse et auprès de Lagny. La V. *D* entre Monidée et Auvillers, où elle est assez commune, et se

Digitized by Google

trouve mêlée à *A. phœnicea*. Elle devient plus rare entre Antheny et Rumigny. Je suis porté à croire que, dans ces deux localités, cette variété nouvelle remplace l'*A. cærulea*, dont elle n'est peut-être qu'une modification. En effet, l'*A. cærulea* y manque complètement.

A. tenella, L. Les marais, à Mons-en-Laonais, Urcel, Presles, Parfondru, etc.; celui de Belasne près Noyon. (j.ⁿ j.ᵗ). Manque à Rocroy.

Lysimachia nemorum, L, (m. j.ⁿ). Cette plante fréquente dans presque tous les bois du canton de Rosoy-sur-Serre, la forêt d'Aubenton, les bois d'Hirson, etc. et la forêt des Ardennes près Rocroy, cesse de croître à Laon, et devient fort rare au bois des deux Muids près Guivry (Chauny).

L. nummularia, L. (vulg. *nummulaire, monnayère, herbe-aux-écus, herbe qui tue les moutons*). j.ⁿ a.ᵗ Prés et bois humides.

L. vulgaris, L. (vulg. *corneille, chasse-bosse*). j.ⁿ j.ᵗ Marais, bords des ruisseaux. J'ai observé au marais de Salmoucy une monstruosité de cette plante à fleurs métamorphosées en feuilles étroites et serrées les unes contre les autres.

(Samolées). Samolus Valerandi, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais à Mons-en-Laonois, Urcel, Chivi, Presles; auprès de Molinchart, Fourdrain; les étangs de Bailli, le marais de Belasne près Noyon.

GLOBULAIRES

Globularia vulgaris, L. (m. j.ⁿ). Les montagnes, à Laon, Noyon.

PLUMBAGINÉES.

Statice plantaginea Allion. (j.ⁿ j.ᵗ). Fréquent dans le Laonais, se trouve aussi à Noyon sur la montagne de Tarlefesse. (vulg. *gazon d'Espagne*).

PLANTAGINÉES.

Plantago major, L. — V. *B*. P. minima, DC. (m. j.ᵗ). Chemins, champs. La V. *B* auprès du Coq-banni, hameau de Jeantes.

P. media, L. — V. *B*. P. minor, Dumaisniel de Belleval. (j.ⁿ a.ᵗ). Prés secs, chemins. V. *B* les montagnes entre Festieux et Bièvre.

P. Lanceolata, L. V. *B*. P. tomentosa, Guép. — V. *C*. P. minima, Gaud. — V. *D*. P. alpina, Gaud. — V. *E*. polystachya. L'espèce dans les prés secs et le long des chemins. La V. *B* dans la rieze de Rocroy, les landes de Rumigny et auprès de Laon : la V. *C* les environs de Givet ; la V. *D* les prés secs à Rocroy : la V. *E* auprès de Machecourt, Aubenton.

Digitized by Google

P. arenaria, W. Kit. (j.t s.). A Laon, sur le Mont-Blanc, Parfondru, Sissonne, Eppes; Ourscamp près Noyon.

MONOCHLAMYDÉES.

AMARANTHACÉES.

Amaranthus blitum, L. (j.t s.). Décombres à Laon, Carlepont, etc.

A. caudatus, L. (j.t s.). Subspontanée au Mont-Blanc près Laon, à Danizy.

CHÉNOPODÉES.

Chenopodium olidum (C. vulvaria, L.). Vulg. *arroche puante, vulvaire*). j.t s. Murs, décombres, chemins.

C. polyspermum, L. (j.t s.). Champs, décombres.

C. album, L. (a.t s.). Champs cultivés, décombres.

C. viride, L. (j.t s.). Champs et lieux incultes.

C. glaucum, L. (j.t s.). Champs, fossés.

C. murale, L. (j.t s.). Murs, cours, décombres.

C. urbicum, L. (j.t s.). Auprès de Laon.

C. rubrum, L.—V. *B.* C. patulum, Mérat.—V. *C.* blitoïdes. Blitum chenopodioides, Lam. (j.t s.). Champs, cours, décombres. La V. *C* auprès de Crécy-sur-Serre.

C. Bonus-Henricus, L. (vulg. *bon Henri, épinard sauvage*). m. a.t Lieux incultes, bords des chemins.

C. hybridum, L. (j.t s.). Lieux cultivés à Noyon, Laon, etc.

Atriplex hortensis, L. (vulg. *arroche, bonne-dame*). j.t s. subspontanée à Rocroy.

A. latifolia, Wahlenb. (j.t s.). Fossés, bords des champs.—V. *B.* A. microsperma, Lois.

A. patula, L. (j.t s.). Lieux incultes.

A. littoralis, L. (j.t s.). Le bord des rivières près Laon.

Spinacia oleracea, L. — V. *A.* S. spinosa, Mœnch. *épinard d'hiver.* — V. *B.* S. inermis, Mœnch. *épinards d'automne ou de Hollande, ou gros épinards.* (m. j.n) Cultivé.

Beta vulgaris, L. (vulg. *bette, betterave*). — V. *B.* B. cycla. (vulg. *poirée*). j.n j.t Cultivée.

POLYGONÉES.

Rumex acetosella, L.—V. *B.* R. multifidus, Thuil. Champs, lieux sablonneux. La V. *B* auprès de Parfondru. (m. j.n).

R. acetosa, L.—V. *B.* R. intermedius, DC. (m.j.t). Bois, prés. La V. *B* à Sécheval. (vulg. *oseille commune*).

Digitized by Google

R. scutatus, L. (vulg. *oseille ronde*). Eté. Assez commune sur le rocher de Charlemont près Givet.

R. aquaticus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Marais, bords des étangs.

R. hydrolapathum, Huds. (j.ᵗ a.ᵗ). Les marais à Chivre, les étangs à Braucourt et les bords de la Meuse.

R. conglomeratus, Schreb. (j.ᵗ a.ᵗ). Lieux humides, fossés.

R. nemorosus, Schrad. (j.ᵗ a.ᵗ). Lieux et bois humides.

R. crispus, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Près humides. (vulg. *parelle*).

R. obtusifolius, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Bords des mares et des fossés.

R. pulcher, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les environs de Laon.

R. maritimus, L. (j.t a.ᵗ). La forêt de Coucy près le rond de la Fons : fort rare.

Polygonum bistorta, L. (vulg. *bistorte*) m. j.ᵗ Fréquente dans presque tous les prés du canton de Rosoy-sur-Serre, les bois de Nampcelle, de Rumigny ; plus rare sur les bords de la Meuse, à Revin, Monthermé.

P. amphibium, L. V. *B.* terrestre. Fossés, lacs. La V. *B* lieux inondés l'hiver.

P. lapathifolium, L. (j.ᵗ o.). — V. *B.* P. nodosum, Pers. Les bords du canal de l'Oise.

P. persicaria, L. (vulg. *persicaire*). j.ᵗ a.ᵗ—V. *B.* P. incanum, DC. Lieux humides et décombres.

P. pusillum, Lam. — V. *B.* P. strictum, Allion. (a.ᵗ s.). Fossés, marais. La V. *B* à Carlepont.

P. hydropiper, L. (vulg. *herbe de St Innocent*). j.ᵗ a.ᵗ Lieux humides.

P. aviculare, L. (vulg. *centinode, traînasse*). m. nov. — V. *B.* P. latifolium, Des. — V. *C.* P. neglectum, Bess. — V. *D.* P. alpinum. Champs, sentiers. La V. *D* entre Antheny et Rumigny.

P. convolvulus, L. (vulg. *vrillée bâtarde*). j.ⁿ j.ᵗ Lieux cultivés.

P. dumetorum, L. (vulg. *grande vrillée bâtarde*). j.ᵗ a.ᵗ Buissons, haies.

P. fagopyrum, L. (vulg. *blé noir, blé sarrasin*). j.ᵗ s. Cultivé.

P. tataricum, L. (j.t a.ᵗ). Cultivé, mais plus rarement que *le P. Fagopyrum.*

THYMÉLÉES.

Stellera passerina, L. (vulg. *herbe à l'hirondelle*). s. o. Auprès de St-Aubin.

Daphne mezereum, L. (vulg. *bois-gentil*). m.ˢ av. Les bois montueux, à Montaigu, Festieux, Veslud, Cheret, Hirson, le grand bois de Chaourse.

D. laureola, L. (fév. m.ˢ). Les bois, à Chauny, Chiry, Ribécourt.

SANTALACÉES.

Thesium linophyllum, L. — V. *B.* T. humifusum, DC. (j.ⁿ

Digitized by Google

j.t). Les montagnes des environs de Laon et de Noyon.

ARISTOLOCHIÉES.

Aristolochia clematitis, L. (m. j.n). Les bords de l'Oise, à Pont-l'Evêque, Ourscamp.

Asarum europæum, L. (vulg. *oreille d'homme*, *cabaret*, *rondelle*, *nard sauvage*). av. m. Les bois de Carlepont.

EUPHORBIACÉES.

Buxus sempervirens, L. (av. m.). Le bois de Beaurain et ceux des environs de Guise, sur le rocher de Charlemont près Givet.

Euphorbia helioscopia, L. (vulg. *réveille - matin*). j.n a.t Champs et lieux cultivés.

E. platyphyllos, L. (j.t oct.). Les Champs du côté de Carlepont.

E. palustris, L. (m. j.n). Les bords de la Meuse de Fumay à Givet.

E. verrucosa, L. (j.n s.). Les bois d'Ourscamp.

E. peplus, L. (j.n). Lieux cultivés.

E. exigua, L. (été). Champs, moissons.

E. lathyris, L. (vulg. *épurge*). m. aut. Subspontané dans quelques jardins.

E. cyparissias, L. (été). Cette plante très commune depuis Carlepont jusqu'à Pierrepont et Bussy, disparaît ensuite complètement dans l'arrondissement de Vervins et auprès de Rocroy, et ne se retrouve que sur les bords de la Meuse à Monthermé, Fumay, Givet.

E. esula, L. (j.t). Les bords de la Meuse à Fumay, Montigny.

E. Gerardiana, Jacq. (m. j.n). Montagne de Laon.

E. nicæensis, Allion. (m. j.n). Les bois près Ribécourt : fort rare.

E. amygdaloides, L.—V. *B.* E. sylvatica, L. (av. m.). Bois.

J'ai observé dans la forêt de St-Gobain, une monstruosité de cette plante, remarquable par la métamorphose de ses fleurs en véritables feuilles.

Mercurialis perennis. L. (av. m.). Bois.

M. annua, L. (vulg. *mercuriale*). j.t déc. Lieux cultivés.

URTICÉES.

(Urticées). Cannabis sativa. L. (vulg. *chanvre*). j.n at. Cultivé.

Deux variétés de *cannabis sativa*, nouvelles pour la science, viennent spontanément sur la montagne de Laon. La première se distingue de l'espèce par ses tiges basses et très rameuses, et ses feuilles le plus souvent à trois folioles; la seconde, par

Digitized by Google

ses feuilles simplement lobées, à sept, cinq, et quelquefois trois lobes, et non à cinq ou sept folioles. Serait-ce le type de l'espèce primitive non encore modifiée par la culture.

Dans les environs de Vervins les paysans nomment *bicque et bouc* les tiges de chanvre qui possèdent les organes mâle et femelle.

Parietaria officinalis, L. (vulg. *pariétaire, casse-pierre, perce-muraille*) Eté. — V. *B.* P. judaica, DC. L'espèce sur les murs, les rochers; la V. *B* à Laon.

Urtica pilulifera, L. (vulg. *ortie romaine*). j.ⁿ j.ᵗ Les murs du jardin de M. Martin, père, à Vigneux.

U. dioica, L. (vulg. *grande ortie*). j.ⁿ nov. Lieux gras, chemins.

U. urens, L. (vulg. *ortie grièche*). j.ⁿ nov. Lieux cultivés, murs, décombres.

Humulus lupulus, L. (vulg. *houblon*). j.ⁿ a.ᵗ Haies, buissons. Cultivé dans les environs de Givet.

(Ulmacées). Ulmus campestris, L. (m.ˢ av.). Routes, villages, etc., ainsi que ses diverses variétés.

U. effusa, Willd. (m.ˢ av.). Les environs de Laon.

(Artocarpées). Morus alba, L. (vulg. *murier blanc.*). av. m. Cultivé.

M. nigra, L. (vulg. *murier noir.*). av. m. Cultivé.

Ficus carica, L. (vulg. *figuier*). j.ᵗ a.ᵗ Cultivé.

JUGLANDÉES.

Juglans regia, L. (vulg. *noyer*). m. Cultivé et presque spontané dans plusieurs bois du Laonais.

AMENTACÉES.

(Salicinées). Salix repens, L. (av. m.). Les marais à Parfondru, Chivre; la rieze de Rocroy.

S. capræa, L. (vulg. *saule marceau*). m.ˢ m. Lieux humides, bois.

S. aurita, L. (vulg. *petit saule ou saule à feuilles rondes*) av. m. — V. *B.* S. ambigua, Ehrh. L'espèce, lieux secs et humides. La V. *B* la forêt des Ardennes près Rocroy.

S. acuminata, Smith. (m. j.ⁿ). Dans les oseraies.

S. viminalis, L. (vulg. *osier blanc.*). m. Cultivé.

S. fissa, Ehrh. (av. m.). Les environs de Laon.

S. monandra, Hoffm. (av.) vulg. *osier rouge.* Les environs de Laon, de Noyon, Aubenton.

S. triandra, L. V. *B.* S. amygdalina, L. (m.). Bords des rivières et des fossés. La V. *B* près Aubenton.

S. babylonica, L. (vulg. *saule pleureur*) Cimetières et jardins. Cultivé.

Digitized by Google

S. alba, L. (vulg. *saule commun, saule blanc*). m. j.ⁿ Prés et bords des eaux.

S. fragilis, L. (m. j.ⁿ). Entre St-Aubin et Blérancourt.

S. vitellina, L. (vulg. *osier, osier jaune*). av. m. Les oseraies.

Populus alba, L. (vulg. *peuplier blanc* ou *peuplier ypréaux*). m.ˢ av. Bois humides, etc.

P. canescens, Smith. (vulg. *grisaille, franc-picard*). m.ˢ av. Bois humides, etc.

P. tremula, L. (vulg. *tremble*). m.ˢ av. Bois humides, etc.

P. nigra, L. (vulg. *peuplier, liard, léard*). m.ˢ av. Lieux humides, bords des rivières.

P. virginiana, Desf. (vulg. *peuplier suisse*). m.ˢ av. Cultivé.

P. fastigiata, Poir. (vulg. *peuplier d'Italie* ou *de Lombardie*). m.ˢ av. Cultivé.

P. canadensis, Desf. (vulg. *peuplier du Canada*). m.ˢ av. Cultivé : rare.

P. angulata, Willd. (vulg. *peuplier de la Caroline*). m.ˢ av. Cultivé : rare.

(Betulinées). Betula pubescens, Ehrh. (av. m.). Le marais de Chivre; les endroits marécageux de la forêt des Ardennes près Rocroy.

Betula alba, L. — V. *B.* B. verrucosa, Ehrh. (av m.). vulg. *bouleau*. Bois; partout. La V. *B* la forêt des Ardennes.

Alnus glutinosa, Gœrtner. (vulg. *aulne*). m.ˢ av. Le long des rivières.

Carpinus betulus, L. (vulg. *charme*). av. m. Bois. Fait la charmille des haies.

(Quercinées). Corylus avellana, L. (vulg. *noisetier*). fév. m.ˢ Bois taillis.

Quercus robur, L. (vulg. *chêne mâle, rouvre, roure, durelin*). av. m. Les bois, forêts.

Q. pubescens, Willd. Bois peu humides. (m.).

Q. pedunculata, Ehrh. (m.). Les forêts, les bois.

Fagus sylvatica, L. (vulg. *fayard, fau, foyard*). m. j.ⁿ Les forêts, bois.

Castanea vulgaris, Lam. (vulg. *châtaignier*). j.ⁿ Les bois près Noyon.

CONIFÈRES.

(Abiétinées). Pinus sylvestris, L. (vulg. *pin de Génève, pinéastre, pinasse*). av. m. Cultivé.

P. maritima, Lam. (m.). Cultivé.

Abies excelsa, DC. (vulg. *pesse, serente, picéa, faux sapin*). av. Cultivé.

A. pectinata, DC. (vulg. *sapin commun*). av. Cultivé.

Larix europæa, DC. (vulg. *mélèze*). av. m. Cultivé.

MM. de Devise et de Bezane ont planté presque toutes ces es-

Digitized by Google

pèces d'arbres verts, le premier sur la montagne St Siméon près Noyon, le second entre Festieux et Morgny-en-Haie.

Juniperus communis, L. (vulg. *genévrier*). av. m. Bords des bois et des collines pierreuses. Cet arbrisseau acquiert 15—20 pieds auprès de la ferme de Biaumont non loin de Dizy-le-Gros.

MONOCOTYLÉDONES.

HYDROCHARIDÉES.

Hydrocharis morsus-ranæ, L. (vulg. *morrène*). j.ⁿ a.ᵗ Les eaux tranquilles auprès de Laon, Noyon.

ALISMACÉES.

(Butomées). Butomus umbellatus, L. (vulg. *jonc fleuri*). m. j.ⁿ Eaux peu courantes à Laon, Noyon, Ponséricourt, Revin.

(Alismées) Alisma plantago, L. (vulg. *plantain aquatique*). j.ⁿ a.ᵗ Fossés, étangs. V. *B.* A. lanceolatum, Hoffm.—V. *C.* A. graminifolia, Ehrh.

A. ranunculoides, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Les marais, à Chivre, Pierrepont, Chivi, Parfondru.

Sagittaria sagittifolia, L. (vulg. *fléchière, flèche d'eau*). j.ⁿ j.ᵗ Bords des rivières et des fossés aquatiques.

(Joncaginées). Triglochin palustre, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Les marais, à Urcel, Laniscourt, Morgny-en-Haie, Noyon, Vauchelles, Cuy, Larbroye, Bussy; auprès d'Harcigny, de Parfondeval.

POTAMÉES.

Potamogeton densus. L. (j.ⁿ j.ᵗ). Fossés.

P. natans, L. (vulg. *épi d'eau*). — V. *B.* P. fluitans, DC. j.ⁿ j.ᵗ Eaux stagnantes.

P. lucens, L. — V. *B.* P. longifolius, Gay. Eaux stagnantes, ruisseaux à Laon, etc.

P. perfoliatus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Etangs, rivières.

P. crispus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Eaux stagnantes à Laon, Noyon.

P. serratus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Fossés, ruisseaux.

P. compressus, L. (été). Fossés, à Laon, Noyon.

P. pusillus, L. (été). Eaux courantes ou stagnantes.

P. pectinatus, L. (été). Le canal de l'Oise entre Chauny et La Fère.

Zannichellia palustris, L. (m. j.ⁿ). fossés aquatiques à Laon, Noyon.

Digitized by Google

ORCHIDÉES.

Orchis bifolia, L. (vulg. *herbe à deux feuilles* ou *aux coupures, double-feuille*). m. j.t Prés, bois.

O. pyramidalis, L. (j.n). Un petit bois situé entre Marchais et Morgny-en-Haie, le bois de Liesse et les prés qui l'avoisinent.

O. coriophora, L. (m. j.n). Les prés humides, à Laon, Noyon, Vervins.

O. ustulata, L. (m. j.n). Les montagnes, à Mons-en-Laonais, Bourguignon; celle de St Siméon près Noyon.

O. tephrosanthos, Vill. (m. j.n). — V. *B.* O. cercopitheca, Lam. Les bois et les prés secs, à Laon, Noyon, Vigneux.

O. galeata, Lam. (m.). Les mêmes lieux que le précédent.

O. militaris, L. (m.). Ibid.

O. fusca, Jacq. (m.). Ibid.

O. mascula, L. (av. m.). Prés humides, coteaux, bois.

O. laxiflora, Lam. — V. *B.* O. palustris, Jacq. (m. j.n). Les marais, à Urcel, Parfondru.

O. morio, L. (m. j.n), Prés, coteaux. La V. à fleur blanche à Noyon, Cuiry, Auvillers.

O. latifolia, L. — V. *B.* flore albo, (nobis). m. j.n Prés humides. La V. *B* dans les marais de Chivre.

O. maculata, L. — V. *B.* foliis immaculatis. — V. *C.* trilobata. (j.n j.t). Prés, bois. La V. *C* forêt des Ardennes.

O. conopsea, L. (j.n j.t). Prés montueux. La variété à fleurs blanches sur la montagne St Siméon près Noyon.

O. odoratissima, L. (j.n j.t). A Mons-en-Laonais, Laniscourt, Parfondru.

O. viridis, Crantz, (m. j.n). Les prés, à Laon, Noyon, Vervins.

O. hircina. Crantz. (j.n j.t). La montagne de Porquéricourt: fort rare.

Ophrys monorchis, L. (j.n j.t). Le marais de Chivre, montagnes de Nouvion-le-Vineux et de Béhéricourt.

O. antropophora, L. (m. j.n). La montagne St Siméon: fort rare.

O. myodes, Jacq. (m. j.n). A Parfondru, Cheret, Chevregny; entre Fontenelle et Bossus.

O. apifera, Huds. (m. j.n). Les environs de Laon, de Noyon; à Vigneux, Brunhamel, entre Fontenelle et Bossus.

O. arachnites, Hoffm. (m. j.n). Des coteaux arides entre Agnicourt et Pontséricourt: fort rare.

O. aranifera, Smith (av. m.). Les environs de Laon de Noyon.

Epipactis grandiflora, Gaud. (j.n). Bois montueux, à Chevregny, Vigneux.

Digitized by Google

E. ensifolia, Sw. (m. j.^{n}). La forêt des Ardennes entre Rocroy et Couvin : fort rare.

E. rubra, Sw. (j.^{n} j.^{t}). La forêt de St Gobain; les bois de Lagny.

E. latifolia, Sw.—V. *B.* E. microphylla, Hoffm. Les environs de Laon, de Noyon, de Vervins.

E. palustris, Sw. (j.^{t} a.^{t}). Prés marécageux, lieux humides des montagnes.

Neottia nidus avis, Rich. (m. j.^{n}). Les bois, à Festieux, Veslud, Prémontré, Porquéricourt, Béhéricourt, le parc du château de Cuiry, le bois de Laferée.

N. ovata, Rich. (m. j.^{n}). Bois humides.

Spiranthes æstivalis, Rich. (j.^{t} a.^{t}). Auprès de Carlepont : fort rare.

S. autumnalis, Rich. (s. oct.). Les montagnes de Tarlefesse, de Grandru.

Sturmia Lœselii, Rchb. (j.^{n} j.^{t}). Le marais de Chivre.

Limodorum abortivum, Sw. Les bois, à Courrizy, Mailly; les montagnes St Siméon, de Porquéricourt, Chiry.

IRIDÉES.

Iris germanica, L. (vulg. *flambe*). m. j.^{n} Les murs, à Crandelain, Bussy-lès-Pierrepont.

I. pumila, L. (av. m.). Les murs, à Laon, Royaucourt St Julien, Morgny-en-Haie.

I. pseudacorus, L. (vulg. *iris* ou *glayeul des marais*). j.^{n} Les marais, bords des fossés aquatiques,

AMARYLLIDÉES.

(Galantées). Leucoium vernum, L. (fév. m.^{s}). Le bois de Francbertin près Brunhamel.

Galanthus nivalis, L. (vulg. *perce-neige*). fév. m.^{s} à Etréaupont; subspontanée au Hoquet près Vigneux.

(Narcissées). Narcissus pseudo - narcissus, L. (vulg. *narcisse des prés* ou *sauvage*, *aiault*, *porillon*, *chaudron*). av. m. Cette plante est très commune auprès de Rocroy, où elle semble appelée par la nature à remplacer le *primula veris*.

ASPARAGINÉES.

(Asparagées). Asparagus officinalis, L. (vulg. *asperge*). j.^{n} j.^{t} Fréquente dans les champs et les prés à Laon, plus rare à Noyon.

Paris quadrifolia, L. (vulg. *herbe à Paris*, *raisin de renard*). m. j.^{n} Bois couverts et montueux.

Convallaria majalis, L. (vulg. *muguet*, *lis des vallées*). m. Bois.

Digitized by Google

C. polygonatum, L. (vulg. *sceau de Salomon*). av. m. Les bois, à Morgny-en-Haie, Montaigu, Liesse.

C. multiflora, L. (m. j.ⁿ).—V. *B.* C. longibracteata, (nobis). Bois, coteaux. La V. *B* observée dans les bois de Coingt, diffère de celle de Rœper par ses pédicelles munis de bractées d'une telle dimension qu'on pourrait, au premier abord, les prendre pour de petites feuilles. J'ai trouvé dans les mêmes lieux une autre variété dont les pédicelles étaient également ornés de longues bractées, et qui, par ses feuilles beaucoup plus larges, mais glabres, se rapprochait du C. latifolia, Hoffm.

C. verticillata, L. (m. j.ⁿ). Bois montueux, à Rocroy, Beaulieu, Eteignères.

Mayanthemum bifolium, DC. Les bois à Montaigu, Morgny-en-Haie, ceux des Essarts, de la Tombelle, de Béhéricourt, la forêt des Trémonts, celle des Ardennes.

(Smilacées). Ruscus aculeatus, L. (vulg. *petit-houx*, *houx-fretон*). m. Haute forêt de Coucy, bois de Carlepont.

(Dioscorées). Tamnus communis, L. (vulg. *sceau de Notre-Dame*, *herbe aux femmes battues*). m. j.ⁿ Haies, bois.

LILIACÉES.

(Tulipacées): Lilium bulbiferum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Sur la montagne St Siméon près Noyon.

(Asphodélées). Muscari racemosum, Miller. (vulg. *ail des chiens*). av. m. Sur la montagne St Siméon.

M. comosum, Miller. (vulg. *ail à toupet*). av. m. Les lieux cultivés, à Laon, Ourscamp, Dreslincourt, Vigneux.

Scilla nutans, Smith. (vulg. *jacinthe des bois*). m. Les bois.

S. bifolia, L. (m.ˢ av.) Le bois de Salmoucy.

Gagea arvensis, Rchb. (G. villosa, Duby). av. Champs.

Ornithogalum umbellatum, L. (vulg. *dame de onze heures*). m. Cette plante assez commune, surtout dans les environs de Laon, manque dans les arrondissements de Vervins et de Rocroy.

Allium ascalonicum, L. (vulg. *échalotte*). j.ⁿ j.ᵗ Cultivé.

A. sphærocephalum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les moissons et les bois, à Sissonne.

A. cepa, L. (vulg. *oignon*) j.ᵗ a.ᵗ Cultivé.

A. vineale, L. — V. *B.* crinitum. — V. *C. A.* sylvaticum, Mér. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, vignes: la V. *C* dans les bois près Rumigny.

A. sativum, L. (vulg. *ail*). j.ⁿ j.ᵗ Cultivé.

A. porrum, L. (vulg. *poreau*). j.ⁿ j.ᵗ Cultivé.

A. schœnoprasum, L. (vulg. *ciboulette*, *civette*). j.ᵗ a.ᵗ Cultivé.

A. ursinum, L. (av. m.). Prés couverts, bois, à Laon,

Digitized by Google

Noyon, Guise, forêts d'Aubenton, des Trémonts, des Ardennes.

A. oleraceum, L. (a. parviflorum, Mer.). j.ⁿ j.ᵗ Champs, vignes.

A. carinatum, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Auprès de Rosoy-sur-Serre.

Anthericum ramosum, L. (vulg. *herbe à l'araignée*). j.ⁿ j.ᵗ Presque toutes les montagnes des environs de Laon ; celle de St Siméon près Noyon.

A. liliago, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les montagnes, à Festieux.

COLCHICACÉES.

(Colchicées). Colchicum autumnale, L. (vulg. *tue-chien, velvote*). — V. *B.* vernum. (s. oct. la V. *B* av.). Prés humides. La V. *B* entre Pontoise et Cus. J'en ai observé une variété à fleur blanche auprès de Brunhamel.

JONCÉES.

Juncus glaucus, Ehrh. (vulg. *jonc des jardiniers*). j.ⁿ j.ᵗ Marais, fossés.

J. conglomeratus, L. (j.ⁿ j.ᵗ) Le long des eaux.

J. effusus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Ibid.

J. squarrosus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Très commun dans la rieze de Rocroy ; fort rare dans le marais de Parfondru près Laon.

J. capitatus, Willd. (J. ericetorum, Pollich). j.ⁿ j.ᵗ Trouvé en 1836 et 1837, entre les briques qui forment le pavé de l'allée du parterre du château de Cuiry.

J. supinus, Mœnch. — V. B. J. uliginosus, Meyer. L'espèce et la variété dans la rieze de Rocroy. (j.ⁿ j.ᵗ).

J. bufonius, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Lieux humides.

J. tenageia, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Les tourbières de la rieze de Rocroy.

J. bulbosus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux humides.

J. lampocarpus, Ehrh. (j.ⁿ j.ᵗ). Ruisseaux, fossés.

J. acutiflorus, Ehrh. (j.ⁿ j.ᵗ). Ibid.

J. obtusiflorus, Ehrh. Lieux humides, (j.ⁿ j.ᵗ).

Luzula vernalis, DC. (av. m.). Bois et lieux couverts.

L. nivea, DC. (j.ⁿ j.ᵗ). Les marais d'Urcel près Laon ; les endroits marécageux de la rieze de Rocroy, à la cense Gallois, Sévigny-la-Forest, Regniowez, le Gué d'Hossus ; les bois entre Rocroy et Revin.

L. maxima, DC. (m. j.ⁿ). La forêt d'Aubenton, les bois d'Hirson ; auprès de Revin.

L. campestris, DC. — V. *B.* nigricans, Desv. (L. sudetica, DC.). — V. *C.* multiflora, Lejeune. — V. *D.* pallescens, Wahlenb. — V. *E.* congesta, Lejeune. (m. j.ⁿ). L'espèce, prés, bois. La V. *B* lieux tourbeux et marécageux de la forêt des Ardennes ; la V. *C* la plupart des bois des cantons de Rosoy-sur-Serre, Aubenton, Hirson ; auprès de Rocroy, de Rumigny,

Digitized by Google

de Laférée. La V. *D* le bois des Nuées près Iviers, ceux de Beaulieu près Rocroy.

AROIDES.

Arum maculatum, L. — V. *B.* immaculatum. (vulg. *pied de veau*). av. m. Haies, bois.

Acorus calamus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Ruisseaux des sources de l'Oise; le gué des Broizes entre Rumigny et Antheny; les bords de la Meuse.

Lemna minor, L. (m. j.ⁿ). Fossés.

L. gibba, L. (m. j.ⁿ). Les environs de Laon.

L. polyrrhiza, L. (m. j.ⁿ). Les environs de Laon, de Vervins.

L. trisulca, L. (m. j.ⁿ). Eaux dormantes.

TYPHACÉES.

Typha latifolia, L. — V. *B. T.* elatior, Bœnningh. (vulg. *masse d'eau*). j.ⁿ j.ᵗ L'espèce dans les fossés du Laonais. La V. *B* aux étangs de Bailly.

T. angustifolia, L. — V. *B.* intermedia, Mutel. L'espèce dans les marais de Salmoucy, Chambry, Urcel : la V. *B* aux étangs de Bailly.

Sparganium ramosum, Huds. (j.ⁿ a.ᵗ). vulg. *ruban d'eau*. Marais, fossés aquatiques.

S. simplex, uds. (j.ⁿ a.ᵗ). Les marais, à Chivi, Etouvelles.

S. natans, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Le marais de Chivre.

CYPÉRACÉES.

(Cypérinées). Cyperus fuscus, L. (j.ᵗ s.). Marais, préshumides.

C. flavescens, L. (j.ᵗ s.). Marais des environs de Laon, Noyon.

Schœnus nigricans, L. (m. j.ⁿ). Les marais et endroits marécageux, à Mons-en-Laonais, Montarcène, Parfondru, Chivre, Pierrepont; très commun à Chivi.

(Scirpinées). Cladium mariscus, R. Brown. (été). Les marais, à Chambry, Liesse, Pierrepont, Chivi, Etouvelles.

Scirpus palustris, L.—V. *B. S.* minor, Gaud.—V. *C. S.* reptans, Thuil. (j.ⁿ a.ᵗ). Marais : V. *B* lieux sablonneux : V. *C* lieux desséchés.

S. bœothryon, Ehrh. (j.ⁿ j.ᵗ). Marais tourbeux à Parfondru, Chivi, Rocroy.

S. lacustris, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Etangs, fossés.

S. maritimus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Marais.

S. sylvaticus, L. (m. j.ᵗ). Lieux aquatiques.

Eriophorum vaginatum, L. (m. (Les endroits marécageux de la rieze de Rocroy.

E. gracile, Koch. (m. j.ⁿ) Le marais de Chivi.

E. polystachium, L. (vulg. *linaigrette, lin des marais*) m. j.ⁿ —V. B. E.

E. angustifolium, Roth. —V. *C.* E. Vaillantii, Mér. — V. *D.* E. montanum. E. polystachion. L'espèce et la V. *B* les marais : les V. *C* et *D* les lieux marécageux de la rieze de Rocroy.

E. latifolium, Hoppe. (m. j.ⁿ). Marais.

Carex divulsa, Good. (m. j.ⁿ). Les bois, à Prémontré, etc.

C. divisa, Huds. (m. j.ⁿ). Cette plante se trouvait jadis au bois du Breuil; je l'ai aussi observée auprès d'Aubenton. On en trouve dans la rieze de Rocroy, une variété à chaume de 5 — 8 pouces, rude au sommet.

C. muricata, L. (m. j.ⁿ). Haies, bois.

C. vulpina, L. (m. j.ⁿ). Marais, bords des ruisseaux.

C. paniculata, L. (m. j.ⁿ). Prés humides.

C. stellulata, Good. (av. m.). Marais des environs de Noyon.

C. canescens, L. (m. j.ⁿ). Les endroits marécageux de la rieze de Rocroy.

C. elongata, L. (m. j.ⁿ). Bois humides à Laon, Noyon, Rocroy.

C. remota, L. (av. m.). Ibid.

C. brizoides, L. (av. m.). Bois humides, à Prémontré : rare.

C. Schreberi, Willd. (m.). La forêt des Ardennes près Rocroy.

C. leporina, L. (av. m.). Prés humides.

C. cyperoides, L. (m. j.ⁿ). Les bois, à Aubenton, Rocroy.

C. intermedia, Good. (av. j.ⁿ). Marais.

C. arenaria, L. (vulg. *salsepareille d'Allemagne*). av. m. Fréquent au Mont-Blanc près Laon, à Chivi, Urcel, entre Veslud et Parfondru, à Goudelancourt-lès-Bérieux.

C. cæspitosa, L. (m. j.ⁿ). Marais, bois humides.

C. stricta, Good. (m.). Ibid.

C. acuta, L. (m. j.ⁿ). Ibid. — V. *B.* C. variegata, Pers. La V. *B* près Rocroy.

C. pallescens, L. (m. j.ⁿ). Prés, bois humides.

C. flava, L. (av. m.). Fossés, prés humides.

C. Hornschuchiana, Hoppe. (m.). Les environs de Rocroy.

C. distans, L. (m. j.ⁿ). Prés humides.

C. depauperata, Good. (m. j.ⁿ). La rieze de Rocroy : rare.

C. panicea, L. — V. *B.* rhizogyna, Leers. (av. m.). Prés humides. La V. *B* la rieze de Rocroy.

C. sylvatica, Huds. (m. j.ⁿ). Les bois, à Cuiry, etc.

C. maxima, Scop. (m. j.ⁿ). La forêt d'Aubenton, les bois de Salency.

C. pseudo-cyperus, L. (j.ⁿ j.ˢ). Marais, fossés.

C. vesicaria, L. (m. j.ⁿ). Les marais, à Laon, Noyon.

C. ampullacea, Good. (m. j.ⁿ). Les marais, à Noyon.

C. riparia, Curt. (av. j.ⁿ). Fossés.

C. paludosa, Good. (m. j.ⁿ). Marais. *C.*

C. præcox, Jacq. (m.ˢ av.). Coteaux secs. *C.*

C. pilulifera, L. (av. m.). Bois secs, pâturages des montagnes.

Digitized by Google

C. humilis, Leysser. (*C.* clandestina, Good.). av. m. Les montagnes entre Bruyères et Parfondru.

C. digitata, L. (av. m.). La montagne de Ville près Noyon.

C. glauca, Scop. (av. m.). Fossés, marais. *C.*

C. hirta, L. (m. j.ⁿ). Lieux sablonneux humides. *C.*

GRAMINÉES.

(Phalaridées). Alopecurus pratensis, L. (m. j.ⁿ). Prés et marais.

A. agrestis, L. (m. j.ⁿ). Prés, champs, vignes.

A geniculatus, L. (m. j.ⁿ). Prés marécageux.

Phleum pratense, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, prés. — V. *B.* P. nodosum, DC. Ibid.

P. Bœhmeri, Wld. (m. j.ᵗ). Les lieux arides entre Marchais et Morgny-en-Haie.

Phalaris arundinacea, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux humides.

Holcus lanatus, L. (m. j.ⁿ). Prés, lisières.

H. mollis, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, coteaux boisés, à Laon, etc.

Anthoxanthum odoratum, L. Prés. (m. j.ⁿ).

(Panicées). Panicum verticillatum, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Champs, lieux cultivés.

P. glaucum, L. — V. *B.* P. prostratum, de Brebiss. (été). Champs.

P. viride, L. (j.ᵗ a.ᵗ). Champs.

P. italicum, C. Bauh. (vulg. *millet des oiseaux*). j.ᵗ a.ᵗ Cultivé.

P. sanguinale, L. (j.ᵗ s.). Champs, lieux secs, à Camelin, etc.

P. filiforme. (Paspalum ambiguum, DC.) j.ᵗ s. Les environs de Noyon, de Laon.

P. crus-galli, L. (été). Fossés, champs humides, à Laon, Noyon. — V. *B.* P. aristatum, Rchb.

(Agrostidées). Agrostis stolonifera, L. — V. *B.* A. alba, L. — V. *C.* A. coarctata, Hoffm. — V. *D.* A. compressa, Willd. (été). Champs, fossés. La V. *D* dans la forêt du Nouvion et près Noyon.

A. vulgaris, Wither. (j.ᵗ a.ᵗ). Bois, prés, champs.

A. canina, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Prairies humides, marais. — V. *B.* A. rubra, DC. La rieze de Rocroy.

A. spica-venti, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, moissons.

Gastridium lendigerum, Gaud. (m. j.ⁿ). Sur le rocher de Charlemont près Givet.

Calamagrostis epigeios, Roth. (j.ᵗ a.ᵗ). Bois secs ou humides.

Phragmites communis. (arundo phramites, L.) vulg. *roseau à balais*. j.ᵗ a.ᵗ Fossés, marais. *C.*

(Chloridées). Chamagrostis minima, DC. (m.ᵃ m.). Sur la montagne de Porquéricourt.

(Avénacées). Aira cæspitosa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Prés, bois.

A. præcox, L. (av. m.). Terres sablonneuses.

Digitized by Google

A. cariophyllea, L. (m. j.ⁿ). Lieux secs.
A. flexuosa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Bois et prés montueux.
Avena flavescens, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Champs, prés.
A. pratensis, L. (m. j.ᵗ). Prés, bords des bois, à Coucy-le-Château, Rosoy-sur-Serre, Rocroy.
A. pubescens, L.—V. *B.* A. amethystina, DC. (j.ⁿ j.ᵗ). Prés, coteaux, haies. La V. *B* dans les environs de Noyon.
A. sativa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Cultivée.
A. orientalis, Schreb. (j.ᵗ a.ᵗ). Cultivée.
A. fatua, L. (j.ⁿ j.t). Moissons.
A. elatior, L. (j.ⁿ a.ᵗ). vulg. *fromental.* Champs, prés. — V. *B* nodosa. (avena precatoria, Thuil.). Lieux sablonneux.
Danthonia decumbens, DC. (m. j.ᵗ). Le bois de la Tombelle près Noyon, fréquente dans la rieze de Rocroy.
(Festucacées). Melica ciliata, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Les environs de Laon.
M. uniflora, Retz. (m. j.ⁿ). Les environs de Laon, de Noyon.
M. nutans, L. (m. j.ⁿ). Les montagnes auprès de Veslud : rare.
Briza media, L. (vulg. *amourette, herbe tremblante, pain d'oiseau*). j.ⁿ j.ᵗ Pâturages, coteaux, bords des bois.
B. minor, L. —V. *B.* B. virens, L. (m. j.ⁿ). Un petit bois entre Leuze et Aubenton.
Poa annua, L. (m. s.). Lieux incultes, cours. C.
P. bulbosa, L. — V. *B.* P. vivipara, Host. (m. j.ⁿ). Champs. La V. *B* à Camelin.
P. trivialis, L. (j.ⁿ a.ᵗ). Prés, chemins, fossés.
P. pratensis, L. — V. *B.* P. angustifolia, DC. (j.ⁿ j.ᵗ). Prés, champs.
P. fertilis, Host. (j.ⁿ j.ᵗ). Fossés, marais.
P. nemoralis, L.—V. *B.* P. glauca, DC. (été). Bois, coteaux. La V. *B* forêt des Ardennes.
P. compressa, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux secs, murs.
Kœleria cristata, Pers. (m. j.ⁿ). Bois secs entre Marchais et Morgny-en-Haie.
Dactylis glomerata, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Prés, haies, chemins.
Cynosurus cristatus, L. (j.ⁿ j.ᵗ). vulg. *crételle, queue de chien*). Prés secs, bois.
Festuca myuros, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux sablonneux près Laon, Noyon.
F. bromoides, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Ibid.
F. ovina, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Ibid.
F. duriuscula, L. (j.ⁿ j.ᵗ). Ibid.
F. arundinacea, Schreb. (j.ⁿ j.ᵗ). Lieux ombragés, bords des ruisseaux.
F. cærulea, DC. — V. *B.* Melica littoralis, Host. (j.ᵗ a.ᵗ). Lieux humides. V. *B* forêt des Ardennes près Rocroy.
F. aquatica, DC. (j.ᵗ a.ᵗ). Marais, bords des fossés.
F. fluitans, L. (m. j.ⁿ). vulg. *herbe à la manne, manne de Prusse.* Fossés, marais.

Digitized by Google

F. airoides. (aira aquatica, L.). m. a.t Fossés, à Aubenton, Noyon, etc.

F. tenella, L. (Triticum tenellum, L.). m. j.n Les montagnes près Revin.

F. gracilis, Mœnch. (Triticum sylvaticum, DC.). La forêt de Bouvresse.

F. pinnata, Mœnch. (été). Champs, haies.

Bromus erectus, Huds. (j.n j.t). Prés secs, à Laon, etc.

B. asper, L. (j.n j.t). Champs, bois montueux.

B. giganteus, L. — V. *B.* B. giganteus, Vill. — V. C. *B.* hispidus. Bois et prés couverts, à Noyon, Laon, etc. (j.n a.t).

B. tectorum, L. (m. j.t). Murs, décombres.

B. sterilis, L. (m. j.n). Lieux stériles, murs, etc.

B. mollis, L. (j.n j.t). Prés secs, le long des maisons.

B. arvensis, L. (j.n j.t). Champs.

B. secalinus, L. (m. j.n). Dans les moissons.

B. multiflorus, DC. (j.n). Sur les bords du canal de l'Oise.

B. racemosus, L. (m. j.n). Champs, prés.

(Hordéacées). Lolium perenne, L. (j.n a.t). — V. *B.* L. ramosum, Leers. Prés, sentiers. (vulg. *ray-grass*).

L. multiflorum, Lam. (été). Champs cultivés.

L. temulentum, L. (vulg. *ivraie*). j.n j.t Champs cultivés.

Triticum vulgare, Vill. (j.n). Cultivé ainsi que ses variétés. (vulg. *blé*).

T. turgidum, L. (vulg. *gros blé, blé barbu*). j.n Cultivé.

T. spelta, L. (vulg. *épeautre*). j.n Cultivé entre Fumay et Givet.

T. caninum, L. (j.n a.t). Buissons, bois, bords des ruisseaux.

T. repens, L. (vulg. *chiendent*). L'espèce et les variétés dans les champs, les lieux pierreux, etc. (j.n j.t).

Secale cereale, L. (j.n). *Le seigle.* Cultivé.

Elymus europæus, L. (j.n j.t). Bois ombragés.

Hordeum vulgare, L. (j.n). *Orge.* Cultivée.

H. hexastichon, L. (j.n). Cultivée.

H. distichon, L. (j.n). Cultivée.

H. murinum, L. (j.n j.t). Murs, chemins.

(Rottboelliacées). Nardus stricta, L. (m. j.n). Les lieux secs, à Mons-en-Laonais, Laferée; croît abondamment dans la rieze de Rocroy; se trouve aussi dans les bois de Beaulieu.

FIN.

Digitized by Google

TABLE

DES FAMILLES.

	Pag.		Pag.
Acérinées	21	Crassulacées . . .	29
Alismacées	59	Crucifères	14
Amaranthacées . .	54	Cucurbitacées . . .	27
Amaryllidées . . .	61	Cypéracées	64
Amentacées. . . .	57	Dicotylédones . . .	1
Ampélopidées . . .	21	Dipsacées	34
Apocynées	42	Droséracées. . . .	17
Araliacées	32	Ericinées	41
Aristolochiées . . .	56	Euphorbiacées . . .	56
Aroïdes	64	Fumariées	14
Asparaginées . . .	61	Gentianées	42
Balsaminées. . . .	21	Géraniacées. . . .	21
Berbéridées. . . .	13	Globulaires	53
Boraginées	45	Graminées	66
Calyciflores. . . .	22	Grossulariées . . .	29
Campanulacées . .	40	Haloragées	28
Caprifoliacées . . .	33	Hippocastanées. . .	21
Cariophyllées . . .	18	Hypéricées	20
Célastrinées. . . .	22	Hydrocharidées . .	59
Cératophyllées. . .	28	Iridées	61
Chénopodées . . .	54	Jasminées	42
Cistées	16	Joncées	63
Colchicacées . . .	63	Juglandées	57
Conifères	58	Labiées	48
Convolvulacées. . .	45	Légumineuses . . .	22
Corolliflores. . . .	42	Lentibulariées . . .	48

Digitized by Google

	Pag.		Pag.
Liliacées.	62	Potamées	59
Linées	19	Primulacées. . . .	52
Loranthées	33	Renonculacées . . .	1
Lythrariées	28	Résédacées	17
Malvacées	20	Rhamnées	22
Monochlamydées . .	54	Rosacées.	25
Monocotylédones . .	59	Rubiacées	33
Monotropées . . .	42	Santalacées	55
Nymphéacées . . .	13	Saxifragées	29
Ombellifères . . .	30	Solanées	44
Onagraires	27	Synanthérées ou Composées	35
Orchidées	60	Thalamiflores . . .	1
Oxalidées . . . :	21	Thymélées	55
Papavéracées . . .	14	Tiliacées.	20
Paronychiées . . .	28	Thyphacées. . . .	64
Personées	45	Urticées	56
Plantaginées . . .	53	Vacciniées	41
Plumbaginées . . .	53	Valérianées	34
Polygalées	17	Verbénacées . . .	52
Polygonées	54	Violacées.	16
Portulacées	28		

ERRATA.

Pag. 13, *lig.* 34. Presque tous les étangs de Bailli sont actuellement desséchés.

Pag. 17, *lig.* 36, au lieu de *le roulier*, lisez : *le rouilly*.

Pag. 18, *lig.* 28, au lieu de S. Conica, lisez : S. conica. La même faute se trouve répétée *pag.* 11 ; *pag.* 12, *lig.* 8, 12, 14, 37 ; *p.* 14, *lig.* 34 ; *p.* 16, *lig.* 25 ; *p.* 23, *lig.* 28 ; *p.* 25, *lig.* 44.

Pag. 19, *lig.* 31, après S. nodosa, L. (j.^{t} a.^{t}), mettez : Les environs de Laon, et supprimez les marais, etc.

Ibid. Entre les *lig.* 32 — 33, mettez : S. subulata, Swartz. (m.j.^{n}). Les marais à Urcel, Parfondru, Vauchelles près Noyon, Dohis, Rocroy.

Pag. 24, *lig.* 20, après E. hirsutum ajoutez : L.

Pag. 42, *lig.* 6, après Syringa vulgaris ajoutez : L.

Pag. 53, *lig.* 1, au lieu de trouve mêlée à *A. phœnicca*, lisez : trouve mêlée à l'*A. phœnicea*.

Pag. 61, *lig.* 18, après Limodorum abortivum, Sw. ajoutez : j.^{n} j.^{t}

Pag. 62, *lig.* 14, après Mayanthemum bifolium, DC. ajoutez : m. j.^{n}

Pag. 64, *lig.* 22, après S. simplex, au lieu de uds, lisez : Huds.

Pag. 64, dernière *lig.*, effacez V. *B* et placez au commencement de la *pag.* 65.

Digitized by Google

Dehier

Stupeur dans les Maladies Menta

Digitized by Google

Digitized by Google





Digitized by Google